

Gripex®+ 200mg/30mg

Ibuprofène / Chlorhydrate de pseudoéphédrine
Comprimé pelliculé

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Ibuprofène 200 mg
Chlorhydrate de pseudoéphédrine 30 mg

Excipients : cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, lauryl sulfate de sodium, hydroxypropyl cellulose, aérosil, talc, opadry blanc.

Boîte de 20 comprimés pelliculés.

INDICATIONS :

Gripex®+ est indiqué chez l'adulte et l'adolescent à partir de 15 ans, dans le traitement symptomatique de la congestion nasale, associée à une rhinosinusite aiguë, présumée virale avec maux de tête et/ou fièvre.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

1 comprimé de **Gripex®+** par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures.

En cas de symptômes plus intenses, prendre 2 comprimés de **Gripex®+** par prise, à renouveler au bout de 6 heures si besoin, sans dépasser 6 comprimés par jour.

La durée de traitement est de 5 jours. En l'absence d'amélioration, il est nécessaire de prendre un avis médical.

Mode d'administration :

Voie orale.

Les comprimés sont à avaler avec un grand verre d'eau, de préférence au cours des repas.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie à l'ibuprofène, à la pseudoéphédrine ou à l'un des constituants.

- Antécédents de saignements ou de perforations gastro-intestinales liées à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou antécédents de récidives d'ulcère gastro-duodénal ou d'hémorragie.

- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise d'un autre AINS ou d'acide acétylsalicylique.

- Maladie grave du foie, des reins ou du cœur (insuffisance coronarienne sévère).

- Hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée par le traitement.

- Antécédents d'accident vasculaire cérébral, de crises cardiaques et de convulsions.

- Risque de rétention urinaire liée à des troubles uréthro-prostatiques.

- Lupus érythémateux disséminé.

- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

• Prévenez votre médecin en cas :

- De maladies cardiaques (insuffisance cardiaque, angine de poitrine (douleurs thoraciques) ou crise cardiaque, pontage chirurgical), artériopathie périphérique (mauvaise circulation dans les jambes ou les pieds, due à des artères rétrécies ou obstruées), accidents vasculaires cérébraux ou accidents ischémiques transitoires.

- D'hypertension artérielle, de diabète, de cholestérol élevé, d'antécédents familiaux de maladie cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral.

- D'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, sinusite chronique ou des polypes dans le nez.

- D'antécédent de maladies gastro-intestinales (hernie hiatale, hémorragie digestive, ulcère de l'estomac ou du duodénum).

- De troubles de la prostate ou d'hyperthyroïdie.

• La pseudoéphédrine peut induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Associations contre-indiquées :

IMAO non sélectifs, autres vasoconstricteurs, décongestionnants nasaux par voie orale ou par voie nasale (phénylpropanolamine, phényléphrine, éphédrine) et méthylphénidate.

IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse :

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant le dernier trimestre de la grossesse, il est prescrit seulement si nécessaire pendant les deux premiers trimestres.

Allaitement :

La prise de ce médicament est contre-indiquée pendant l'allaitement.

EFFETS SUR LA CONDUITE DE VEHICULES ET L'UTILISATION DE MACHINES :

Dans de rares cas, la prise de ce médicament peut entraîner des vertiges et des troubles de la vue.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Fréquents : troubles gastro-intestinaux, nausées, vomissements, diarrhée, ballonnements, douleurs abdominales, troubles de la digestion.

Peu fréquents : maux de tête, vertiges, réactions allergiques.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure à 30°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste II.

Date de révision de la notice :

Janvier 2019.

D.E Algérie :

Gripex®+ 200mg/30mg : 16/22 A 043/035.

Fabricant, détenteur de D.E et conditionneur :

Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir.

Ouled Fayet-Alger, Algérie.

غريباكس® + 200 مغ / 30 مغ إبوبروفان / كلور هيدرات البسودو إيفيدرين قرص مغلف

- سوابق أمراض الجهاز الهضمي (فتق الحجاب الحاجز، نزيف الجهاز الهضمي، قرحة المعدة أو معي الإثنا عشر).
- اضطرابات البروستات أو فرط نشاط الغدة الدرقية.
• يمكن أن يؤدي البسودو إيفيدرين إلى نتيجة تحليل إيجابية في اختبارات الكشف عن المنشطات.

التفاعلات الدوائية: الجمع ضد مشار إليه:

مثبطات أوكسيداز مونوأمين غير الانتقائية، مضيقات الأوعية الأخرى، ومزيلات الاحتقان الأنفية عن طريق الفم أو الأنف (فينيل بروبانولامين، فينيليفرين، الإيفيدرين) ومثيل فينيدات.
قبل استعمال هذا الدواء يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي بأي دواء جاري تناوله.

الحمل والإرضاع:

الحمل:
يمنع استخدام هذا الدواء خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، يمكن أن يشار إليه خلال الثلاثي الأول والثاني إلا إذا كان ذلك ضرورياً.

الإرضاع:

يمنع استخدام هذا الدواء خلال الإرضاع.

الآثار على القيادة واستخدام الآلات:

في حالات نادرة، يمكن أن يسبب هذا الدواء الدوخة واضطرابات الرؤية.

الآثار غير المرغوب فيها:

الشائعة: الاضطرابات المعوية المعوية، الغثيان، القيء، الإسهال، الانتفاخ، آلام البطن واضطرابات الجهاز الهضمي.
الغير شائعة: الصداع، الدوخة وردود الفعل التحسسية.

فرط الجرعة:

في حالة فرط الجرعة يجب استشارة الطبيب.

طريقة الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية، بعيداً عن الضوء والرطوبة.
لا يترك في متناول الأطفال.

قائمة II.

تاريخ مراجعة الوصفة:

جانفي 2019.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر:

غريباكس® + 200 مغ / 30 مغ : 16/22 A 043/035.

الصانع، صاحب مقرر التسجيل والمعبن:

فارماليانس.

حوش كوشي إدير أولاد فايت - الجزائر.

التركيب والشكل:

إبوبروفان.....200 مغ
كلور هيدرات البسودو إيفيدرين.....30 مغ
علبة تحتوي على 20 قرص مغلف.

السواغات:

سيلولوز ميكروكريستالين، كروسكارملوز الصوديوم، لوريل سولفات الصوديوم، هيدروكسي بروبيل سيلولوز، إيروزيل، تالك، أوبادراي أبيض.

دواعي الاستعمال:

يوصف غريباكس® + لدى البالغين و المراهقين الذين يتجاوز عمرهم 15 سنة لعلاج أعراض احتقان الأنف، مرتبطة مع التهاب الأنف و الجيوب الحاد، المفترض فيروسي مع الصداع و / أو الحمى.

الجرعة وطريقة الإستعمال:

الجرعة:

قرص واحد من غريباكس® + لكل جرعة، يجدد إذا لزم الأمر بعد 6 ساعات. في حالة وجود أعراض أكثر حدة، أخذ قرصين من غريباكس® + لكل جرعة، يتم تجديدها بعد 6 ساعات إذا لزم الأمر، دون تجاوز 6 أقرص في اليوم الواحد.
مدة العلاج 5 أيام. في حالة غياب التحسن، فمن الضروري أخذ رأي الطبيب.

طريقة الإستعمال:

عن طريق الفم.
تؤخذ الأقرص مع كوب كبير من الماء، ويفضل مع وجبات الطعام.

موانع الإستعمال:

- الحساسية للابوبروفان، البسودو إيفيدرين أو أحد المكونات الأخرى.
- سوابق النزيف أو الانتفاخ المعوي الناتج عن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية أو سوابق القرحة المعوية المتكررة أو النزيف.
- سوابق الحساسية أو الربو الناتجة عن استخدام مضادات الالتهاب غير الستيرويدية الأخرى أو حمض أسيتيل الساليسيليك.
- أمراض الكبد، الكلى أو القلب (قصور الشريان التاجي الحاد).
- ارتفاع شديد لضغط الدم أو ضغط الدم غير متوازن بالعلاج.
- سوابق الصدمة الدماغية، النوبات القلبية والتشنجات.
- خطر الاحتباس البولي المتعلق باضطرابات الإحليل البروستاتي.
- الذئبة الحمامية المنتشرة.
- في حالة خطر الزرق عن طريق إغلاق الزاوية.

التحذيرات و احتياطات الإستعمال:

• ينبغي إخبار الطبيب في حالة:

- أمراض القلب (قصور القلب، الذئبة الصدرية (ألم الصدر)) أو النوبات القلبية، تجاوزات جراحية، أمراض الشرايين الطرفية (ضعف الدورة الدموية في الساقين أو القدمين، بسبب ضيق أو انسداد الشرايين)، السكتات الدماغية أو نوبات نقص تروية عابرة.
- ارتفاع ضغط الدم، داء السكري، ارتفاع الكوليسترول، سوابق عائلية لأمراض القلب أو السكتة الدماغية.
- سوابق الربو المرتبطة بالتهاب الأنف المزمن، التهاب الجيوب الأنفية المزمن أو الأورام الحميدة في الأنف.