

Antalfen-Gyn® 100 mg

Flurbiprofène
Comprimé pelliculé

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Flurbiprofène 100 mg.

Excipients : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, opadry bleu.

Excipient à effet notoire : lactose.

Boîte de 20 comprimés pelliculés.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Antalfen-Gyn® est préconisé, chez l'adulte et l'enfant à partir de 15 ans :

- Lors des règles douloureuses.
- En traitement de **longue durée** de certains rhumatismes inflammatoires chroniques, de certaines arthroses sévères.
- En traitement de **courte durée** de certaines inflammations du pourtour des articulations (tendinite, bursite, épaule douloureuse aiguë), douleur aiguë d'arthrose, douleurs lombaires aiguës, douleurs aiguës liées à l'irritation d'un nerf telles que les sciatiques.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

• Affections rhumatismales :

- Traitement d'attaque : 1 comprimé d'**Antalfen-Gyn®** 100 mg, 3 fois par jour.

- Traitement d'entretien : 1 comprimé d'**Antalfen-Gyn®** 100 mg, 1 à 2 fois par jour.

• **Règles douloureuses** : 1 comprimé d'**Antalfen-Gyn®** 100 mg, 2 à 3 fois par jour, dès le début des douleurs et jusqu'à disparition des symptômes.

Mode d'administration :

Voie orale. Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau, de préférence au cours d'un repas.

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de ce médicament, autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), d'acide acétylsalicylique ou à l'un des excipients.

- Antécédents de saignements gastro-intestinaux ou d'ulcères liés à des traitements antérieurs par AINS.

- Ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien en évolution ou récidivant.

- Hémorragie gastro-intestinale, hémorragie cérébrale ou autre hémorragie en cours.

- Maladie grave du foie, du cœur, ou du rein.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenez votre médecin en cas :

- d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez.

- d'antécédents digestifs (ulcères anciens de l'estomac ou du duodénum, hémorragie digestive).

- de maladie du cœur, du foie ou du rein.

- de traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire concomitant.

Une surveillance régulière est nécessaire chez les patients présentant une hypertension artérielle et/ou un diabète.

Ce médicament contient du lactose, son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Acide acétylsalicylique ou d'autres AINS, corticostéroïdes, anticoagulants oraux comme l'acénocoumarol, héparine injectable, antiagrégants plaquettaire, lithium, méthotrexate, inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, diurétiques, bêta-bloquants (sauf esmolol) et antagonistes de l'angiotensine II, certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine), pemetrexed, ciclosporine, tacrolimus.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, veuillez signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : ce médicament est contre-indiqué à partir du 6^{ème} mois de grossesse. Au cours des 5 premiers mois de grossesse, votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament.

Allaitement : ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Ce médicament peut entraîner des vertiges.

EFFETS INDÉSIRABLES :

- réactions allergiques : éruption, démangeaisons, œdème, urticaire, crise d'asthme, brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique (œdème de Quincke), choc allergique.

- hémorragie digestive (rejet de sang par la bouche ou dans les selles, une coloration des selles en noir).

- troubles digestifs de type nausées, vomissements, maux d'estomac, digestion difficile, troubles du transit (diarrhée, constipation).

- vertiges, maux de tête, troubles de la vue, troubles du fonctionnement des reins.

- des ulcères ou perforations gastro-intestinales ont pu être observés.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NE PAS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Date de révision de la notice : Mai 2022.

Liste II.

D.E Algérie :

Antalfen-Gyn® 100 mg : 21/15/ 04 B 033 / 035.

Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur :
Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir.
Ouled Fayet-Alger, Algérie.



أنتلفان-جين® 100 مغ

فلوربيروفان

قرص مغلف

الكورتيكوستيرويدات، مضادات التخثر الفموية مثل أسينوكومارول، الهيبارين عن طريق الحقن، العوامل المضادة للصفائح، الليثيوم، الميثوتريكسات، مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، مدرات البول، حاصرات بيتا، مضادات الأنجيوتنسين، بعض مضادات الاكتئاب (مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية)، بيميتريكسيد، سيكلوسبورين، تاكروليموس. لتفادي التفاعلات الممكنة بين عدة أدوية، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن أي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

التركيب والشكل:

فلوربيروفان 100 مغ

السواغات: لاكتوز احادي الاماهة، سيلولوز ميكروكريستالين، كروسكرملوز الصوديوم، سد يليس كوليديل اللامائي، ستيريرات المغنزيوم، أوبادراي أزرق. سواغ ذو تأثير معلوم: لاكتوز. علبه تحتوي على 20 قرص مغلف.

دواعي الاستعمال:

يوصى باستخدام أنتلفان-جين® للبالغين والأطفال ابتداء من سن 15 عاماً:

• أثناء أيام الدورة الشهرية.

• **كعلاج طويل الأمد** لبعض الروماتيزم الالتهابي المزمن، بعض أنواع التهاب المفاصل الحاد.

• **في العلاج قصير الأمد** لبعض الالتهابات حول المفاصل (التهاب الأوتار، التهاب الجراب، آلام الكتف الحادة)، الألم الحاد في هشاشة العظام، آلام الظهر الحادة، الآلام الحادة المصاحبة لتهدج العصب مثل عرق النسا.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

الجرعة:

الأعراض الروماتيزمية:

- الجرعة الأولية: قرص واحد من أنتلفان-جين® 100 مغ، 3 مرات في اليوم.
- جرعة المداومة: قرص واحد من أنتلفان-جين® 100 مغ، مرة إلى مرتين يوميا.
- **عسر الطمث:** قرص واحد من أنتلفان-جين® 100 مغ، 2 إلى 3 مرات يوميا، منذ بداية الآلام حتى اختفاء الأعراض.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم. يتم بلع الأقراص مع كوب من الماء من الأفضل خلال وجبات الطعام.

موانع الاستعمال:

- سوابق للحساسية أو الربو ناتجة عن تناول الدواء أو مضادات الالتهاب غير الستيروبيدية الأخرى أو حمض أسيتيل الساليسيليك أو أحد السواغات.
- ظهور أو تكرار الإصابة بقرحة المعدة أو الاثني عشر القديمة.
- نزيف معدي معوي، نزيف دماغي أو نزيف آخر.
- أمراض الكبد، القلب أو الكلى الخطيرة.

تحذيرات واحتياطات الاستعمال:

• أخبر طبيبك في حالة:

- سوابق الربو المرتبط بالتهاب الأنف المزمن أو التهاب الجيوب الأنفية أو الأورام الحميدة في الأنف.
- سوابق هضمية (قرحة المعدة أو الاثني عشر سابقة، النزيف الهضمي)، يجب بدأ العلاج بأقل جرعة ممكنة والجمع مع علاج حامي.
- أمراض القلب، الكبد أو الكلى.
- العلاج بمضادات التخثر أو مضادات تجمع الصفائح.
- ينصح بمراقبة منتظمة للمرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الشرياني و / أو مرض السكري.
- الفلوربيروفان يضعف الخصوبة لذلك لا ينصح استخدامه عند النساء اللاتي تحاولن الإنجاب.

- يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز، لذلك لا ينصح استخدامه لدى المرضى اللذين يعانون من عدم احتمال الغلاكتوز أو سوء امتصاص الغلوكوز أو الغلاكتوز.
التفاعلات الدوائية:
حمض أسيتيل الساليسيليك أو غيره من مضادات الالتهاب غير الستيروبيدية،

الحمل والإرضاع:

الحمل:

لا يجب استخدام هذا الدواء ابتداء من الشهر السادس من الحمل. خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحمل، يمكن لطبيبك وصف هذا الدواء اذا لزم الامر.

الإرضاع:

لا ينصح باستخدام هذا الدواء أثناء الإرضاع.

الأثار على السياقة واستخدام الآلات:

قد يسبب تناول هذا الدواء الدوخة.

الأثار غير المرغوب فيها:

- تفاعلات تحسسية: طفح جلدي، حكة، وذمة، شرى.
- نوبة الربو.
- انتفاخ مفاجئ في الوجه والرقبة ناتج عن حساسية (وذمة وعائية)، صدمة تحسسية.
- نزيف هضمي (استرجاع الدم عن طريق الفم أو في البراز، لون البراز أسود).

- اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء وآلام المعدة وصعوبة الهضم واضطرابات هضمية (الإسهال والإمساك).
- دوار، صداع، اضطرابات بصرية، اضطرابات في وظائف الكلى.
- قد تكون قد لوحظت تقرحات أو ثقوب في الجهاز الهضمي.

فُرط الجرعة:

في حالة فُرط الجرعة، استشر طبيبك.

طريقة الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 °م، بعيدا عن الضوء والرطوبة. لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة II

تاريخ مراجعة الوصفة : ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر:

أنتلفان-جين 100 مغ : 033/035 B 21/15/04

الصانع، صاحب مقرر التسجيل والمعين:

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت - الجزائر.