

Antalfen[®] 5%

Ibuprofène Gel

COMPOSITION ET PRESENTATION :

Ibuprofène.....5g
pour 100 g de gel.

Excipients : isopropanol, hydroxyéthylcellulose, alcool benzylique, hydroxyde de sodium.

Tube de 50 g.

INDICATIONS :

Traitement local de courte durée des traumatismes bénins: tendinites superficielles, entorses et contusions, chez l'adulte et l'adolescent à partir de 15 ans.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

Une application d'Antalfen[®] 5%, 3 fois par jour.

Mode d'administration :

Voie locale. Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé, sur la région douloureuse ou inflammatoire.

La durée de traitement est limitée à 5 jours.

CONTRE-INDICATIONS :

- Antécédents d'allergie à l'ibuprofène, aux substances d'activité proche (autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), aspirine) ou à l'un des excipients.
- Peau lésée : eczéma, lésion infectée, brûlure, plaie ou dermatoses suintantes.
- A partir du 6^{ème} mois de grossesse.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ce médicament ne doit pas être appliqué sur les muqueuses, sur une surface étendue du corps, ou sur les yeux.
- L'apparition d'une réaction cutanée après application du gel impose l'arrêt immédiat du traitement.
- En cas d'utilisation régulière et très fréquente, le port de gants est recommandé.
- Ne jamais appliquer une dose supérieure à celle qui est recommandée.
- Respecter la fréquence et la durée de traitement.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

En raison du faible passage systémique lors d'un usage normal du gel, les interactions

médicamenteuses signalées pour l'ibuprofène par voie orale sont peu probables.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : l'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée, que sur les conseils de votre médecin, pendant les 5 premiers mois de la grossesse, et est contre-indiquée à partir du 6^{ème} mois.

Allaitement : l'utilisation de ce médicament est à éviter chez les femmes qui allaitent.

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Sans objet

EFFETS INDESIRABLES :

- Réactions allergiques : cutanées, respiratoires (type crise d'asthme) ou générales.
- Réactions cutanées locales liées à la voie d'administration (rougeurs, démangeaisons).
- Autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens : ils sont fonction de la quantité de gel appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

SURDOSAGE :

Si vous avez appliqué de trop fortes doses, rincez abondamment à l'eau. En cas d'apparition d'une réaction allergique, cutanée ou générale, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

A conserver pendant 1 mois après ouverture, à une température inférieure à 30°C.

Date de révision de la notice : Mai 2022.

D.E Algérie:

Antalfen[®] 5% : 17/21A 057/035

Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur :
Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir.

Ouled Fayet-Alger, Algérie.


Pharmalliance

انتالفان® 5%

إبوبروفان
هلام

التركيب و الشكل:

إبوبروفان 5 غ للاستخدام العادي، فإن التفاهلات الدوائية المبلغ عنها
ل 100 غ من الهلام.

الحمل و الارضاع:

الحمل: لا يستعمل هذا الدواء إلا وفق نصيحة الطبيب،
خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحمل، و يمنع استخدامه
ابتداءً من الشهر السادس من الحمل.
الارضاع: ينبغي تجنب استخدام هذا الدواء خلال فترة
الارضاع.

السواغات: إيزوبروبانول، هيدروكسي إيثيل
سيلولوز، كحول بنزلييك، هيدروكسيد الصوديوم.
انبوب يحتوي على 50 غ.

دواعي الاستعمال:

العلاج الموضعي على المدى القصير لدى البالغ و
المراهق ابتداءً من 15 عاماً للإصابات الخفيفة: التهاب
سطحي للأوتار، الإلتواءات و الكدمات.

الآثار على السيقاة و استخدام الآلات :
بدون ملاحظة.

الجرعة و طريقة الاستعمال:

الجرعة:

تطبيق انتالفان® 5%، 3 مرات في اليوم.

طريقة الاستعمال:

استعمال موضعي. فرك الهلام مع تدليك خفيف و مطول
و توسيعه ليشمل المنطقة المؤلمة أو الملتهبة.
تحدد مدة العلاج ب 5 أيام.

الآثار غير المرغوب فيها:

- الحساسية: جلدية، تنفسية (نوع نوبة ربو) أو عامة.
- ردود الفعل الجلدية المحلية المتعلقة بطريقة الإستعمال
(الاحمرار، الحكة).
- الآثار العامة الأخرى للأدوية المضادة للالتهاب غير
الستيروبيدية: متعلقة بكمية الهلام المطبقة، السطح المعالج
و حالته، مدة العلاج و استخدام أو عدم استخدام ضمادة
مغلقة.

موانع الإستعمال:

- سوابق للحساسية للإبوبروفان، مواد ذات نشاط مماثل
(أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير الستيروبيدية،
أسبيرين) أو أي من السواغات.
- الجلد التالف: الأكزيما، الآفة المصابة، الحروق، الجرح
أو النزيف الجلدي.
- ابتداءً من الشهر السادس من الحمل.

فرط الجرعة:

في حالة تطبيق جرعة عالية جداً، يشطف جيداً بالماء.
إذا حدث رد فعل تحسسي أو جلدي أو عام، استشر
طبيبك.

طريقة الحفظ:

يحفظ لمدة شهر واحد بعد الفتح، في درجة حرارة أقل من
30 °م.

تحذيرات و احتياطات الاستعمال:

- لا يستخدم هذا الدواء على الأغشية المخاطية، على
مساحة واسعة من الجلد أو العينين.
- في حالة ظهور رد فعل جلدي بعد إستخدام الهلام، يجب
وقف العلاج فوراً.

رقم مقرر التسجيل:

انتالفان® 5%: 17/21A 057/035

- في حالة الإستخدام المنتظم و المتكرر، فمن المستحسن
إرتداء القفازات.

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبي:
فارماليانس

حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر

- لا تطبق جرعة أعلى من الموصى بها.
- إحترام تردد و مدة العلاج.

التفاعلات الدوائية:

بسبب ضعف نسبة مرور الهلام في الجسم خلال