

Aténor® 100 mg

Aténolol

Comprimé sécable

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Aténolol.....100 mg.
Excipients : carbonate de magnésium, amidon de maïs, gélatine en poudre, laurylsulfate de sodium, stéarate de magnésium.
Boîte de 30 comprimés sécables.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

- Hypertension artérielle.
- Prévention des crises d'angine de poitrine.
- Certains troubles du rythme cardiaque.
- Après un infarctus du myocarde.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

- **Hypertension artérielle** : 1 comprimé d'Aténor® 100 mg par jour en une seule prise, le matin.
- **Autres indications** : ½ comprimé à 2 comprimés d'Aténor® 100 mg par jour, selon le cas.

Mode d'administration :

Voie orale. Les comprimés d'Aténor® doivent être avalés avec une boisson.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie à l'aténolol ou à l'un des composants.
- Asthme et broncho-pneumopathies chroniques obstructives dans leurs formes sévères.
- Défaillance de la fonction du cœur (insuffisance cardiaque) non contrôlée par le traitement.
- Bloc auriculo-ventriculaire grave (trouble de la conduction cardiaque).
- Angor de Prinzmetal (dans les formes pures et en monothérapie).
- Maladie du sinus (y compris bloc sino-auriculaire).
- Rythme cardiaque ralenti inférieur à 45-50 battements par minute.
- Phénomène de Raynaud et troubles artériels périphériques dans leurs formes sévères.
- Phéochromocytome non traité.
- Hypotension (diminution de la pression artérielle).
- Antécédent de choc anaphylactique (réaction allergique).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- **Prévenez votre médecin en cas de :**
 - Maladie rénale, maladie de la thyroïde, insuffisance cardiaque.
 - Diabète.
 - Intervention chirurgicale programmée nécessitant une anesthésie générale.
 - Réaction allergique.
 - Examen radiologique nécessitant l'injection de l'iode.
- N'interrompez jamais le traitement brutalement sans avis de votre médecin, en particulier en cas d'angine de poitrine.
- L'attention des sportifs est attirée sur le fait que cette spécialité contient une substance susceptible de rendre positifs certains tests antidopage, en tenir compte chez le sportif.
- L'utilisation de ce médicament chez les enfants n'est pas recommandée.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Associations contre-indiquées : floctafénine, sultopride.

Associations déconseillées : bépridil, diltiazem et vérapamil.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, veuillez signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : en cas de besoin, ce médicament peut être pris durant votre grossesse.

Si ce traitement est pris en fin de grossesse, une surveillance médicale du nouveau-né est nécessaire pendant quelques jours.

Allaitement : ce médicament est contre-indiqué pendant l'allaitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Des vertiges ou une fatigue peuvent survenir occasionnellement, en tenir compte lors de la conduite de véhicules ou l'utilisation de machines.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Fréquents : douleurs abdominales, nausées, vomissements, fatigue en début de traitement, refroidissement des mains et des pieds, ralentissement du pouls, impuissance.

Rares : diminution du taux de sucre dans le sang (hypoglycémie), détérioration ou aggravation d'une maladie du cœur (insuffisance cardiaque ou défaillance cardiaque), chute de la pression artérielle, aggravation d'une claudication (difficulté à marcher) intermittente existante, syndrome de Raynaud (troubles de la circulation du sang au niveau des doigts avec des engourdissements), troubles respiratoires (respiration difficile) chez les patients asthmatiques ou ayant des antécédents d'asthme, recrudescence d'un psoriasis.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste I.

Date de révision de la notice : Mai 2022.

D.E. Algérie :

Aténolol® 100 mg : 07/ 00/ 06F 069/ 035.

Fabricant, détenteur de la D.E. et conditionneur :
Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet - Alger, Algérie.

أتينور[®] 100 مغ

أتينولول

قرص قابل للتجزئة

التركيب والشكل :

أتينولول.....100 مغ.
السواغات : كربونات المغنسيوم، نشاء الذرة، مسحوق الجيلاتين، لوريل سولفات الصوديوم، ستيرات المغنسيوم. غلبة تحتوي على 30 قرص قابل للتجزئة.

دواعي الاستعمال :

- ارتفاع ضغط الدم.
- الوقاية من الذبحة الصدرية.
- بعض اضطرابات ضربات القلب.
- علاج بعد احتشاء عضلة القلب.

الجرعة وطريقة الاستعمال :

الجرعة :

□ ارتفاع ضغط الدم : قرص واحد من أتينور[®] 100 مغ يوميا في جرعة واحدة، في الصباح.
□ استعمالات أخرى : 1/2 قرص إلى قرصين من أتينور[®] 100 مغ في اليوم، حسب الحالة.

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم. يجب أخذ أقراص أتينور[®] 100 مغ مع مشروب.

موانع الاستعمال :

- حساسية تجاه الأتينولول، أو أحد المكونات الأخرى.
- الربو وداء الانسداد الرئوي المزمن بأشكاله الحادة.
- فشل وظائف القلب (قصور القلب) لا يتحكم فيه العلاج.
- كتلة أذينية بطينية شديدة (اضطراب التوصيل القلبي).
- ذبحة برنزميتال (في أشكالها النقية وخلال معالجة أحادية الدواء).
- مرض الجيوب القلبية (بما في ذلك كتلة الجيوب الأذينية).
- معدل ضربات القلب منخفض أقل من 45-50 نبضة في الدقيقة.
- ظاهرة رينود واضطراب الشرايين المحيطية في أشكالها الحادة.
- ورم القواتم غير المعالج.
- انخفاض ضغط الدم.
- سوابق صدمة الحساسية (رد فعل تحسسي).

تحذيرات و احتياطات الاستعمال :

أخبر طبيبك في حالة :

- أمراض الكلى، أمراض الغدة الدرقية، فشل القلب.
- داء السكري.
- الجراحة المبرمجة التي تتطلب تخديرا عاما.
- رد فعل تحسسي.
- الفحص الإشعاعي الذي يتطلب حقن اليود.
- لا تتوقف عن العلاج فجأة دون استشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تعاني من ذبحة صدرية.
- يتم لفت انتباه الرياضيين إلى أن هذا الدواء يحتوي على مادة يمكن أن تجعل بعض اختبارات مكافحة المنشطات إيجابية، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
- لا ينصح باستخدام هذا الدواء لدى الأطفال.

التفاعلات الدوائية :

- الجمع الممنوع : فلوكتافينين، سولتوبريد.
- الجمع غير المنصوح به : بيبريدل، ديلتيازام، فيراباميل.
- لتجنب التفاعلات المحتملة بين عدة أدوية، يجب إبلاغ طبيبك أو الصيدلي عن أي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

الحمل والإرضاع :

الحمل : إذا لزم الأمر، يمكن تناول هذا الدواء خلال فترة الحمل. إذا تم تناول هذا الدواء في نهاية الحمل، فإن الإشراف الطبي على المولود الجديد ضروري لبضعة أيام.
الإرضاع : يمنع استخدام هذا الدواء أثناء الإرضاع.

الآثار على السيقانة واستخدام الآلات :

قد يتسبب أحيانا في حدوث دوخة أو تعب، يجب أخذ هذا بعين الاعتبار عند قيادة المركبات أو استخدام الآلات.

الآثار غير المرغوب فيها :

الشائعة : آلام في البطن، غثيان، قيء، تعب في بداية العلاج، الشعور ببرودة اليدين والقدمين، تباطؤ نبض القلب، العجز الجنسي.

النادرة : انخفاض نسبة السكر في الدم، تدهور أو تفاقم أمراض القلب (قصور القلب، فشل القلب)، انخفاض ضغط الدم، تفاقم العرج المتقطع (صعوبة المشي)، متلازمة رينود (اضطرابات الدورة الدموية في الأصابع مع التتميل)، اضطرابات الجهاز التنفسي (صعوبة في التنفس) لدى المرضى الذين يعانون من الربو أو لديهم سوابق الربو، عودة داء الصدفية.

فرط الجرعة:

في حالة فرط الجرعة، يجب استشارة الطبيب.

طريقة الحفظ :

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 30 °م، بعيدا عن الرطوبة والضوء.
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة I.

تاريخ مراجعة الوصفة : ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر :

أتينور 100 مغ : 07/ 00/ 06F 069/ 035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل والمعبي :

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت - الجزائر.