

## Céfimax® Nourrissons 40 mg/5 ml

## Céfimax® Enfants 100 mg/5 ml

### Céfixime

### Suspension buvable après reconstitution

#### COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Céfixime trihydraté... 40 mg/5 ml de suspension reconstituée.

Céfixime trihydraté... 100 mg /5 ml de suspension reconstituée.

**Excipients :** saccharose, gomme xanthane, silice colloïdale anhydre, benzoate de sodium, érythrosine, arôme fraise.

Excipient à effet notoire : saccharose.

Flacons de 40 ml de suspension buvable après reconstitution.

#### RECONSTITUTION :

1- Agiter le flacon avant d'ajouter de l'eau.

2- Ajouter une petite quantité d'eau pour dissoudre le produit.

3- Agiter de nouveau.

4- Compléter avec de l'eau jusqu'au trait indiqué sur l'étiquette.

5- Agiter vigoureusement de nouveau pendant une minute, pour obtenir une suspension homogène.

6-Avant la première utilisation, laisser reposer la suspension reconstituée pendant au moins 20 minutes.


La suspension est prête à l'emploi.

#### MODE D'ADMINISTRATION :

Par voie orale. L'administration se fait :


• Pour Céfimax® Nourrissons 40 mg/5 ml à l'aide de la pipette graduée en kg de 1 à 10 Kg.

La dose maximale délivrée par la pipette est de 40 mg



• Pour Céfimax® Enfants 100 mg/5 ml à l'aide de la pipette graduée en kg de 1 à 25 Kg.

La dose maximale délivrée par la pipette est de 100 mg.



La dose par prise est indiquée en fonction du poids de l'enfant sur le piston de la pipette. Elle se lit directement sur ses graduations.

#### INDICATIONS ET POSOLOGIE :

Traitement des infections bronchiques et pulmonaires, des otites moyennes aiguës et de certaines infections urinaires chez l'enfant de plus de 3 ans.

Nourrisson et enfant : 1 dose par Kg de poids, 2 fois par jour.

La dose recommandée est de 8 mg/kg/jour, en deux prises, à 12 heures d'intervalle.

#### Céfimax® Nourrissons 40 mg/5 ml (de 6 à 30 mois) :

Pour un nourrisson de 6 kg, remplir la pipette jusqu'à la graduation de 6 kg, 2 fois par jour.

Pour un nourrisson de 15 kg, remplir la pipette jusqu'à la graduation de 10 kg puis rajouter une dose de 5 kg (pour un total de 15 kg), 2 fois par jour.

#### Céfimax® Enfants 100 mg/5 ml (30 mois à 12 ans) :

Pour un enfant de 32 kg, remplir la pipette jusqu'à la graduation de 25 kg puis rajouter une dose de 7 kg (pour un total de 32 kg), 2 fois par jour.

Demandez l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie au céfixime ou à l'un des excipients.

- Allergie à un autre antibiotique de la famille des bêta-lactamines.

#### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- En cas d'allergie aux autres bêta-lactamines, tenez compte de la possibilité d'allergies croisées.

- En cas de maladie des reins.

- En cas d'anémie hémolytique après la prise d'un antibiotique de la famille des céphalosporines.

- En cas de diarrhée, il est indispensable d'informer votre médecin avant de prendre un médicament anti-diarrhéique.

- En cas d'apparition de boutons ou des démangeaisons.

- En cas de réaction cutanée sévère de type éruption de bulles avec décollement de la peau pouvant rapidement s'étendre à tout le corps.

- Certains résultats d'examen de laboratoire peuvent être faussés (test de Coombs, glycosurie).

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients avec une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

- Ce médicament contient 1.59 g de saccharose par 5 ml de suspension reconstituée, dont il faut tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, veuillez signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

En cas de besoin, ce médicament peut être pris pendant la grossesse. L'allaitement est possible avec la prise du médicament. Si le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhée, éruption cutanée, candidose, avertissez votre médecin.

#### EFFETS INDÉSIRABLES :

**Fréquents:** diarrhée, allergie.

**Peu fréquents:** nausées, vomissements, digestion difficile, douleurs au ventre, insuffisance rénale, anomalies de la numération de la formule sanguine.

#### SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

#### CONSERVATION :

Après reconstitution, la suspension se conserve au maximum 10 jours à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de la lumière et l'humidité.

**Notez en clair la date de reconstitution de la suspension sur la boîte.**

**NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.**

#### Liste I.

**Date de révision de la notice :** Mai 2022.

#### D.E Algérie :

Céfimax® 40 mg/5 ml : 18 /13B 197/035.

Céfimax® 100 mg/5 ml : 18/13B 198/035.

#### Fabricant, détenteur de D.E et conditionneur :

**Pharmalliance.**

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet-Alger, Algérie.

## سيفيماكس® للرضع 40 مغ / 5 مل سيفيماكس® للأطفال 100 مغ / 5 مل

سيفيكسيم  
معلق للشرب بعد التركيب

### التركيب و الشكل :

سيفيكسيم ثلاثي الإماهة ..... 40 مغ/ 5 مل من المعلق بعد التركيب. أطلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

### مواعيد الاستعمال :

- سيفيكسيم ثلاثي الإماهة ..... 100 مغ/ 5 مل من المعلق بعد التركيب.
- السواغات : ساكاروز، صمغ الزنتان، سيليس كولويدال اللامائي، بنزوات الصوديوم، هيربثروزين، عطر الفراولة.
- سواغ ذو تأثير معلوم : ساكاروز.
- زجاجات تحتوي على 40 مل من المعلق بعد التركيب.

### تركيب المعلق :



- 1 - رج الزجاجات قبل إضافة الماء.
- 2 - إضافة قليل من الماء لإذابة المسحوق.
- 3 - رج الزجاجات من جديد.
- 4 - ملء بالماء إلى العلام الموجودة على الملصق.
- 5 - رج الزجاجات جيدا لمدة دقيقة واحدة، للحصول على معلق متجانس.
- 6 - قبل الإستعمال الأول، ترك المعلق المركب يرتاح لمدة 20 دقيقة على الأقل.

المعلق جاهز للإستعمال.

### طريقة الإستعمال :

عن طريق الفم. يؤخذ الدواء :

- سيفيماكس® للرضع 40 مغ / 5 مل، بإستعمال الماصة المدرجة بالكغ من 1 إلى 10 كغ.
- الجرعة القصوى التي تسلمها الماصة هي : 40 مغ.



مستوى القراءة

- سيفيماكس® للأطفال 100 مغ / 5 مل، بإستعمال الماصة المدرجة بالكغ من 1 إلى 25 كغ.



مستوى القراءة

الجرعة القصوى التي تسلمها الماصة هي : 100 مغ.

تؤخذ الجرعة حسب وزن الطفل بالكيلوغرام المؤشر على الماصة.

### دواعي الإستعمال و الجرعة :

- علاج التهاب الأذن الوسطى الحاد، التهابات الشعب الهوائية و الرئة و بعض الإلتهابات البولية عند الأطفال الذين يتجاوز عمرهم 3 سنوات.
- الأطفال و الرضع : جرعة واحدة حسب الوزن مرتين في اليوم.
- الجرعة الموصى بها هي 8 مغ للكيلوغرام الواحد في اليوم، مقسمة الى جرعتين، يفصل بين الجرعة الأولى والثانية 12 ساعة.

### سيفيماكس® للرضع 40 مغ / 5 مل :

بالنسبة لرضيع وزنه 6 كغ، يجب ملء الماصة إلى التدرج 6 كغ المؤشرة على الماصة و ذلك مرتين في اليوم.

بالنسبة لرضيع وزنه 15 كغ، يجب ملء الماصة إلى التدرج 10 كغ المؤشرة على الماصة ثم إضافة جرعة 5 كغ (أي ما يعادل 15 كغ)، مرتين في اليوم.

### سيفيماكس® للأطفال 100 مغ / 5 مل :

بالنسبة لطفل وزنه 32 كغ، يجب ملء الماصة إلى التدرج 25 كغ المؤشرة على الماصة ثم إضافة جرعة 7 كغ (أي ما يعادل 32 كغ)، مرتين في اليوم.

أطلب رأي الطبيب أو الصيدلي.

### مواعيد الاستعمال :

- فرط الحساسية للمادة الفعالة أو أحد السواغات.
- فرط الحساسية لمضاد حيوي آخر ينتمي لنفس هذه العائلة البيتاكتامين.

### تحذيرات و احتياطات الإستعمال :

- في حالة وجود حساسية من البيتاكتامينات الأخرى، يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث حساسية مختلطة.
- في حالة مرض الكلى .
- في حالة فقر الدم الانحلالي بعد أخذ مضاد حيوي من عائلة السيفالوسبورين.
- في حالة الإسهال لا بد من إبلاغ طبيبك قبل أخذ دواء مضاد للإسهال.
- في حالة ظهور البثور أو الحكة.
- في حالة رد فعل حاد للجلد مثل الطفح الجلدي الفقاعي، مع تقشير البشرة مع إمكانية الانتشار بسرعة إلى الجسم كله.
- يمكن أن تكون بعض نتائج تحاليل طبية مشوهة : البحث عن الكيتونات أو الغلوكوز في البول و تحاليل كومبس.
- لا ينصح باستخدام هذا الدواء في حالة عدم تحمل الفركتوز أو الغالكتوز أو سوء امتصاص الغلوكوز أو الغالكتوز أو نقص السوكراز / إيزومالتاز و اللاكتاز (أمراض وراثية نادرة) .

- يحتوي هذا الدواء على 1.59 غ من الساكاروز لكل 5 مل، والتي يجب مراعاتها في حالة اتباع نظام غذائي منخفض السكر أو مرض السكري.

### التفاعلات الدوائية :

لتفادي التفاعلات الدوائية الممكنة ما بين عدة أدوية، يجب حتما إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

### الحمل والإرضاع :

إذا لزم الأمر، يمكن تناول هذا الدواء أثناء الحمل. يمكن الإرضاع عند أخذ هذا الدواء. إذا كان الرضيع يعاني من مشاكل مثل الإسهال، طفح جلدي، داء المبيضات، اطلب رأي الطبيب.

### الآثار غير المرغوب فيها :

الشائعة : إسهال، حساسية.

الأقل شيوعا : غثيان، تقيؤ، عسر الهضم، آلام البطن، الفشل الكلوي، خلل في تعداد الدم الكامل.

### فرط الجرعة :

في حالة فرط الجرعة، استشر الطبيب.

### طريقة الحفظ :

بعد التركيب يحتفظ بالمعلق لمدة 10 أيام كحد أقصى في درجة حرارة لا تتجاوز 30 ° م، بعيدا عن الضوء و الرطوبة.

اكتب بوضوح تاريخ تركيب المعلق على العبوة.

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

### قائمة ا.

تاريخ مراجعة الوصفة : ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر :

سيفيماكس® 40 مغ / 5 مل : 18/13 B 197/035

سيفيماكس® 100 مغ / 5 مل : 18/13B 198/035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعين :

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت - الجزائر.