

Dolmatol® 37,5 mg/325 mg

Tramadol/Paracétamol

Comprimé pelliculé

COMPOSITIONS ET PRÉSENTATION:

Tramadol chlorhydrate 37.5mg.
Paracétamol 325mg.

Excipients : primogel amidon glycolate sodique, amidon de maïs, amidon prégélatinisé, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, opadry II blanc.
Boîtes de 10 et 20 comprimés pelliculés.

INDICATION THÉRAPEUTIQUE:

Traitement symptomatique des douleurs modérées à intenses chez l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Posologie : la dose initiale recommandée est de 2 comprimés de Dolmatol®. Des doses complémentaires peuvent être administrées en fonction des besoins, sans dépasser 8 comprimés par jour. Les prises doivent être espacées d'au moins 6 heures.

Mode d'administration:

Voie orale. Les comprimés doivent être avalés tels quels, avec une boisson en quantité suffisante et ne doivent pas être fractionnés, ou mâchés.

CONTRE-INDICATIONS:

- Allergie au chlorhydrate de tramadol, ou au paracétamol
- Patients traités par les Inhibiteurs de la Monoamine Oxydase (IMAO), les hypnotiques, les antalgiques centraux, les opioïdes ou les psychotropes.
- Insuffisance hépatique sévère.
- Intoxication aigue par l'alcool.
- Epilepsie non contrôlée par un traitement.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- **Prévenez votre médecin en cas de :**
 - Maladie du foie, jaunisse ou des troubles biliaires.
 - Maladie des reins.
 - Asthme ou une maladie grave des poumons.
 - Epilepsie ou convulsions.
 - Blessure à la tête ou violents maux de tête accompagnés de vomissements.
 - Dépendanceaux opioïdes(morphine), ou aux médicaments contre la douleur.
 - Anesthésie programmée.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Ce médicament ne doit pas être administré pendant la grossesse et l'allaitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Une somnolence et des vertiges peuvent survenir au cours du traitement, en tenir compte lors de la conduite de véhicules ou de l'utilisation de machines.

EFFETS INDÉSIRABLES:

Très fréquents : nausées, vertiges, somnolence.

Fréquents : vomissements, digestion difficile (constipation, ballonnements, diarrhée), douleurs abdominales, sécheresse de la bouche, démangeaisons, sueurs, maux de tête, tremblements, confusion, troubles du sommeil, modifications de l'humeur (anxiété, nervosité, euphorie).

SURDOSAGE:

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de l'humidité et de la lumière.

NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste I

Date de révision de la notice : Mai 2022.

D.E Algérie :

Dolmatol®37,5 mg/325 mg : 14/03 F 115/035

Fabricant, détenteur de D.E et conditionneur : Pharmalliance.

Domaine. Kouchi Idir, Ouled Fayet, Alger-Algérie.

دولماتول® 37.5 مغ / 325 مغ

ترامادول/ باراسيتامول
قرص مغلف

التركيب والشكل :

ترامادول كلور هيدرات 37.5 مغ.
باراسيتامول 325 مغ.
السواغات : بريموجال نشاء غليكولات الصوديوم، نشاء الذرة، نشاء قبل المهيلم، سيليس كولونيدال اللاماني، ستيرات المغنزيوم، أوبدراي II أبيض.
علبة تحتوي على 10 و 20 قرص مغلف.

دواعي الاستعمال :

علاج أعراض الآلام من المعتدلة إلى الحادة عند البالغين والمراهقين ابتداء من 12 سنة.

الجرعة وطريقة الاستعمال :

الجرعة الأولى الموصى بها هي قرصين من دولماتول. يمكن إعطاء جرعات إضافية حسب الحاجة، دون تجاوز 8 أقراص يوميًا. يجب أن تؤخذ الجرعات في فترات متباعدة ب 6 ساعات على الأقل.
طريقة الاستعمال :
عن طريق الفم. يجب بلع الأقراص كما هي، مع تناول شراب بكمية كافية ويجب عدم تجزئتها أو مضغها.

موانع الاستعمال :

حساسية لكلور هيدرات الترامادول، أو الباراسيتامول.
المرضى الذين يأخذون مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (IMAO)،
المنومات، مسكنات الألم المركزية، المواد الأفيونية أو الأدوية المهدئة.
قصور كبد حاد.
التسمم الحاد بالكحول.
الصرع الغير مسيطر عليه بالعلاج.

تحذيرات واحتياطات الاستعمال :

أخبر طبيبك في حالة :
- أمراض الكبد، يرقان أو اضطرابات في المرارة.
- أمراض الكلى.
- ربو أو مرض خطير في الرئتين.
- الصرع أو التشنجات.
- إصابة في الرأس أو صداع شديد مع قيء.
- الإدمان على المواد الأفيونية (المورفين)، أو الأدوية المضادة للألم.
- التخدير المبرمج.

التفاعلات الدوائية :

لتفادي التفاعلات المحتملة بين الأدوية المتعددة، يجب إبلاغ طبيبك أو الصيدلي عن أي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

الحمل والإرضاع :

لا يجب استعمال هذا الدواء أثناء الحمل والإرضاع.

الآثار على القيادة واستخدام الآلات :

يمكن حدوث دوخة ونعاس أثناء أخذ العلاج يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند قيادة السيارات واستخدام الآلات.

الآثار غير المرغوب فيها :

الشائعة جدا : غثيان، دوار، نعاس.
الشائعة : قيء، صعوبة في الهضم (إمساك، انتفاخ، إسهال)، الآم البطن، جفاف الفم، حكة، تعرق، صداع، ارتعاش، ارتباك، اضطرابات في النوم، تغيرات في المزاج (قلق، عصبية، نشوة، الشعور بالفرح).

فراط الجرعة :

في حالة فراط الجرعة، استشر طبيبك.

طريقة الحفظ :

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 °م، بعيدا عن الضوء والرطوبة. لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة I.

تاريخ مراجعة الوصفة : ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر :

دولماتول® 37.5 مغ / 325 مغ : 14/03 F 115/035.

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبي :

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت - الجزائر

