

## Dompérone® 10 mg

Dompéridone

Comprimé pelliculé

### COMPOSITION ET PRESENTATION :

Dompéridone maléate.....10 mg

**Excipients :** Acide fumarique, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, cellulose microcristalline, sodium croscarmellose, opadry blanc, cire de carnauba.

Boîte de 40 comprimés pelliculés.

### INDICATION :

Traitement symptomatique des nausées et des vomissements.

### POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

#### Posologie :

Adultes et adolescents à partir de 12 ans et de 35 kg : la posologie est de 10 mg par jour, soit 1 comprimé de **Dompérone® 10 mg** par jour ; sans dépasser 3 comprimés par jour.

#### Mode d'administration :

Voie orale. Les comprimés doivent être pris avant les repas. Habituellement, la durée maximale du traitement ne doit pas dépasser une semaine.

### CONTRE- INDICATIONS :

- Allergie à la dompéridone ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- Tumeur hypophysaire à prolactine (prolactinome).
- Patients présentant des saignements de l'estomac, douleurs abdominales sévères régulières ou selles noires persistantes.
- Patients présentant des intestins obstrués ou perforés.
- Patients atteints d'insuffisance hépatique modérée ou sévère.
- Patients atteints d'insuffisance cardiaque ou présentant un trouble cardiaque sur l'ECG appelé "allongement de l'intervalle QT corrigé".
- Patients présentant une diminution ou une augmentation du taux de potassium dans le sang, une diminution du taux de magnésium.

### MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Informer votre médecin en cas de survenue du moindre trouble neurologique et/ou cardiaque (palpitations, difficultés à respirer, perte de conscience).
- En cas d'insuffisance rénale, une diminution de la dose peut s'avérer nécessaire.
- **Respecter strictement la dose prescrite par votre médecin.**

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou pharmacien.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

**Grossesse:** ce médicament ne doit être utilisé pendant la grossesse que lorsque le bénéfice thérapeutique attendu se justifie.

**Allaitement:** ce médicament ne doit pas être utilisé au cours de l'allaitement.

### EFFETS INDESIRABLES :

**Fréquent :** sécheresse buccale.

**Peu fréquents :** perte du désir sexuel, anxiété, agitation, nervosité, somnolence, maux de tête, mouvements involontaires de la face ou des bras et des jambes, tremblements excessifs, raideur musculaire excessive ou spasmes musculaires, diarrhée, éruption cutanée, démangeaisons, écoulement de lait par le mamelon, seins douloureux ou sensibles, sensation générale de fatigue.

### SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

### CONSERVATION :

À conserver à température ambiante inférieure à 30 °C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne pas dépasser la date limite inscrite en clair sur l'emballage.

**NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS.**

### Liste II

### Date de révision de la notice:

Mai 2022.

### D.E Algérie :

**Dompérone® 10 mg :** 07/ 10F 046/ 035.

### Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur :

**Pharmalliance.**

Domaine Kouchi Idir.

Ouled Fayet, Alger - Algérie.

## دومبيرون 10<sup>®</sup> مغ

دومبيريدون

قرص مغلف

### التركيب و الشكل:

دومبيريدون ماليات ..... 10مغ  
السواغات: حمض الفوماريك، ستييرات المغنزيوم،  
سيليس كولويدال اللامائي، سيلولوز ميكروكريستالين،  
كروسكرملوز الصوديوم، اوبادراي ابيض، شمع  
كرونوبا.

علبة تحتوي على 40 قرص مغلف.

### دواعي الاستعمال:

- علاج أعراض الغثيان والقيء.

### الجرعة و طريقة الاستعمال:

#### الجرعة:

البالغين و المراهقين ابتداء من 12 سنة و 35 كغ:  
الجرعة هي 10 مغ في اليوم، أي قرص واحد في  
اليوم.

الجرعة القصوى هي 30 مغ، أي قرص واحد 3 مرات  
في اليوم.

#### طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم. يؤخذ هذا الدواء قبل الوجبات.  
يجب أن لا تتجاوز مدة العلاج أسبوع.

### موانع الاستعمال:

- فرط الحساسية للدومبيريدون أو لأحد السواغات.  
- ورمة نخامية للبرولاكتين (برولاكتنوم).  
- لدى المرضى الذين يعانون من نزيف المعدة، آلام  
حادة و منتظمة في البطن أو براز أسود مستمر.  
- المرضى الذين يعانون من الأمعاء المتعسرة أو  
المتقوية.  
- المرضى الذين يعانون من اختلال كبدي معتدل أو  
شديد.

- المرضى الذين يعانون من قصور في القلب أو  
اضطراب في القلب على المخطط الكهربائي المسمى  
تمديد فاصل QT المصحح.  
- المرضى الذين يعانون من انخفاض أو زيادة  
مستويات البوتاسيوم في الدم، انخفاض مستويات  
المغنزيوم.

### تحذيرات خاصة و احتياطات الاستعمال:

- أبلغ طبيبك في حالة حدوث أي اضطرابات عصبية و /  
أو قلبية (خفقان، صعوبة في التنفس، فقدان الوعي).  
- في حالة القصور الكلوي، تخفيض الجرعة قد يكون  
ضروريا.  
- احترم بدقة الجرعة التي يحددها الطبيب.

### التفاعلات الدوائية:

لتفادي أي تفاعلات دوائية ممكنة ما بين عدة أدوية،  
يجب حتما إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر  
يؤخذ في نفس الوقت.

### الحمل و الإرضاع:

**الحمل:** لا يجب استخدام هذا الدواء خلال فترة الحمل  
الا اذا كانت الفائدة العلاجية المتوقعة مبررة.  
**الإرضاع:** لا ينبغي استخدام هذا الدواء أثناء الإرضاع.

### الآثار غير المرغوب فيها:

#### الشائعة: جفاف الفم.

الأقل شيوعا: فقدان الرغبة الجنسية، القلق، الإثارة،  
العصبية، النعاس، الصداع، الحركات اللاإرادية للوجه  
أو الذراعين والساقين، الرعشة المفردة، تصلب  
العضلات المفردة، التشنجات العضلية، الإسهال،  
الطفح الجلدي، الحكة، إفراز الحليب من الحلمة، ثدي  
مؤلم أو حساس، الإحساس بالتعب العام.

### فرط الجرعة:

في حالة فرط الجرعة، استشر طبيبك.

### طريقة الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 ° م، بعيدا عن  
الضوء و الرطوبة.  
لا تتجاوز حد التاريخ المنصوص عليه بوضوح فوق  
العلبة.  
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

### قائمة II

### تاريخ مراجعة الوصفة:

ماي 2022.

### رقم مقرر التسجيل في الجزائر:

دومبيرون 10<sup>®</sup> مغ :

07/ 10F 046/ 035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبي:

فارماليانس

حوش كوشي إدير، أولاد فايت - الجزائر



Pharmalliance

C - PH60246