

Doricept® 5 mg, 10 mg

Donépézil

Comprimé orodispersible

COMPOSITION ET PRÉSENTATIONS :

Donépézil 5 mg 10 mg.

Excipients : lactose monohydraté, copolymère basique de méthacrylate, aérosil, mannitol, crospovidone, aspartame, stéarate de magnésium.

Excipients à effet notoire : lactose monohydraté, aspartame.

Boîte de 30 comprimés orodispersibles.

INDICATIONS :

Doricept® est utilisé uniquement chez l'adulte, pour le traitement symptomatique de la maladie d'Alzheimer dans ses formes légères à modérément sévères.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie : la dose d'initiation est d'un comprimé de **Doricept® 5 mg**, le soir. Après un mois de traitement, votre médecin peut augmenter cette posologie à 10 mg, en une prise, soit 1 comprimé de **Doricept® 10 mg** ou 2 comprimés de **Doricept® 5 mg** en une prise, le soir, avant le coucher.

La posologie quotidienne maximale recommandée est de 10 mg.

Mode d'administration :

Voie orale. Le comprimé doit être placé sur la langue pour permettre sa désintégration avant de l'avaler, avec ou sans eau, pendant ou après le repas.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie connue au donépézil, aux dérivés de la pipéridine ou à l'un des composants.
- En cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance) en raison de la présence d'aspartame.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTION D'EMPLOI :

- **Prévenez votre médecin en cas de :**
 - Antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.
 - Antécédents de convulsion.
 - Antécédents de maladie cardiaque (rythme cardiaque irrégulier ou très lent).
 - Asthme ou certaines maladies pulmonaires chroniques.
 - Maladie du foie ou une hépatite.
 - Difficultés à uriner ou une maladie des reins.
- En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.
- Ce médicament n'est pas recommandé chez l'enfant.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs

médicaments, veuillez signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse, sauf avis contraire de votre médecin.

Allaitement : ce médicament ne doit pas être utilisé pendant l'allaitement.

CONDUITE DE VÉHICULE ET UTILISATION DE MACHINES :

Vertiges, fatigue et crampes musculaires peuvent survenir au cours du traitement, en tenir compte lors de la conduite des véhicules et l'utilisation de machines.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Très fréquents : diarrhée, nausées, vomissements, maux de tête.

Fréquents : crampes musculaires, fatigue, insomnies, rhume, perte de l'appétit, hallucinations, agitation, agressivité, rêves anormaux et cauchemars, syncope, vertiges, douleurs abdominales, éruption cutanée, démangeaisons, incontinence urinaire, douleurs, chutes répétées.

Peu fréquents : convulsions, ralentissement des battements du cœur, hémorragies gastro-intestinales.

Rares : symptômes neurologiques, cardiaques, hépatiques incluant hépatite.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de l'humidité et de la lumière.

NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste I.

Date de révision de la notice : Mai 2022.

D.E Algérie :

Doricept® 5 mg : 15/15 F 103/035.

Doricept® 10 mg : 15/15 F 104/035.

Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur :
Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet. Alger - Algérie.

دوريسبت® 5 مغ، 10 مغ

دونيبيزيل

قرص قابل للذوبان في الفم

التركيب و الشكل :

دونيبيزيل.....5 مغ10 مغ. الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت. يجب حتما إبلاغ السواغات : لاكتوز أحادي الإماهة، كوبوليمير ميثاكريلات أساسي، ابروزيل، مانيتول، كروسوبوفيدون، أسبارتام، ستيترات المغنيزيوم. سواغات ذات تأثير معلوم : لاكتوز أحادي الإماهة، أسبارتام. علبه تحتوي على 30 قرص قابل للذوبان في الفم.

دواعي الاستعمال :

يستخدم دوريسبت® فقط عند البالغين في علاج أعراض مرض الزهايمر من أشكاله الخفيفة إلى متوسطة الشدة. الآثار على السياقة واستخدام الآلات : يمكن حدوث دوخة، تعب وتشنجات عضلية أثناء العلاج، يجب أخذها بعين الاعتبار عند القيادة واستخدام الآلات.

الجرعة و طريقة الاستعمال :

الجرعة :

الجرعة الأولية هي قرص واحد من دوريسبت 5 مغ، كل مساء. بعد شهر واحد من العلاج، قد يزيد طبيبك هذه الجرعة إلى 10 مغ، في جرعة واحدة، أي قرص واحد من دوريسبت 10 مغ أو قرصين من دوريسبت 5 مغ في جرعة واحدة مساء قبل النوم. الجرعة اليومية القصوى الموصى بها هي 10 مغ.

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم. يجب وضع القرص على اللسان للسماح بتفككه قبل البلع، مع أو بدون ماء، أثناء أو بعد الوجبة.

موانع الاستعمال :

- حساسية معروفة للدونيبيزيل، مشتقات البيبيريدين أو لأحد المكونات.
- في حالة بيلة الفينيل كيتون (مرض وراثي يتم اكتشافه عند الولادة) بسبب وجود الأسبارتام.

تحذيرات و احتياطات الاستعمال :

• أخبر طبيبك في حالة :

- سوابق قرحة المعدة أو المعى الاثني عشر.
- سوابق التشنج.
- سوابق مرض القلب (معدل ضربات القلب غير منتظم أو بطيء جدا).
- الربو أو بعض أمراض الرئة المزمنة.
- أمراض الكبد أو التهاب الكبد.
- صعوبة في التبول أو مرض الكلى.
- بسبب وجود اللاكتوز، لا ينبغي أن يستخدم هذا الدواء في حالة وجود الغالاكتوز في الدم، متلازمة سوء امتصاص الغلوكوز و الغالاكتوز أو نقص اللاكتاز.
- هذا الدواء لا يوصى به عند الطفل.

فرط الجرعة :

في حالة فرط الجرعة، استشر طبيبك.

الحفظ :

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 30 °م، بعيدا عن الرطوبة و الضوء.
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة I.

تاريخ مراجعة الوصفة : ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر :

دوريسبت 5 مغ :

دوريسبت® 10 مغ : 15/15 F 103/035

15/15 F 104/035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبيء :
فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر.