

Eufor® 80 mg

Phloroglucinol Dihydraté
Comprimé orodispersible

COMPOSITION ET PRESENTATION:

Phloroglucinol dihydraté 80 mg.

Excipients : Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, stéarate de magnésium, povidone, arôme menthe.

Excipient à effet notoire: lactose.

Eufor® 80 mg:

Boite de 10 comprimés orodispersibles.

Boite de 30 comprimés orodispersibles.

INDICATIONS:

- Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.

- Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires: coliques néphrétiques.

Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie.

- Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Posologie:

Eufor® 80 mg:

Chez l'adulte, la posologie est de 2 comprimés, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants sans dépasser 6 comprimés par 24 heures.

Chez l'enfant de plus de 2ans: 1 comprimé à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 2 comprimés par 24 heures, après dissolution dans un verre d'eau.

MODE D'ADMINISTRATION:

Voie orale.

Les comprimés orodispersibles peuvent être administrés en les laissant fondre sous la langue, sans eau ou après dissolution dans de l'eau. Chez l'enfant, ils doivent être dissous dans un verre d'eau avant administration.

CONTRE INDICATIONS:

- Allergie au phloroglucinol ou à l'un des autres composants.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:

L'association de **Eufor®** avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de

leur effet spasmogène.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de l'adulte ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES:

Sans objet.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Grossesse:

L'utilisation du phloroglucinol ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

Allaitement:

Il est conseillé d'éviter l'utilisation de ce médicament pendant l'allaitement.

EFFETS SUR L'APTITUDE À CONDUIRE DES VÉHICULES ET À UTILISER DES MACHINES:

Sans objet.

EFFETS INDÉSIRABLES:

Manifestations cutanéomuqueuses et allergiques: éruption, rarement urticaire, exceptionnellement œdème de Quincke, hypotension artérielle, choc anaphylactique.

SURDOSAGE:

Sans objet.

CONSERVATION:

À conserver dans l'emballage extérieur d'origine à une température ne dépassant pas les 30°C, à l'abri de l'humidité.

NE JAMAIS LAISSER CE MEDICAMENT A LA PORTEE DES ENFANTS.

Date de la notice: Mai 2022.

D.E. Algérie :

Eufor® 80mg : 16/10 E 108 /035.

Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur:

Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir

Ouled Fayet-Alger, Algérie.

أوفور® 80 مغ فلورو غلوسينول ثنائي الإماهة قرص قابل للذوبان في الفم

التركيب و الشكل:

فلورو غلوسينول ثنائي الإماهة.....80 مغ.

السواغات: لاكتوز أحادي الإماهة، سيلولوز ميكروكريستالين، كروسبوفيدون، ستيرات المغنيزيوم، بوفيدون، نكهة النعناع. سواغ ذو تأثير معلوم: لاكتوز.

أوفور® 80 مغ :

علبة تحتوي على 10 أقراص قابلة للذوبان في الفم.

علبة تحتوي على 30 قرص قابل للذوبان في الفم.

احتياطات الاستعمال و تحذيرات خاصة:

يجب تجنب إستعمال أوفور® مع المسكنات الرئيسية مثل المورفين أو مشتقاتها و هذا لتأثيرها التشنجي.

يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز. لا ينصح باستخدامه عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الغلاكتوز، نقص اللاكتاز أو متلازمة سوء امتصاص الغلوكوز أو الغلاكتوز (أمراض وراثية نادرة).

التفاعلات الدوائية:

بدون موضوع.

الحمل و الإرضاع:

الحمل:

يجب تجنب إستعمال الفلورو غلوسينول أثناء الحمل إلا عند الضرورة.

الرضاعة:

ينصح تجنب إستعمال هذا الدواء أثناء الرضاعة.

الآثار على السياقة و استخدام الآلات:

بدون موضوع.

الآثار غير المرغوب فيها:

ظواهر مخاطية جلدية و حساسية: طفح، نادرا الشرى، بشكل استثنائي دمة وعائية، انخفاض ضغط الدم، صدمة حساسية.

فرط الجرعة:

بدون موضوع.

طريقة الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30°م في العلبة الأصلية بعيدا عن الرطوبة.

لا يترك في متناول الأطفال.

تاريخ الوصفة: ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر:

أوفور® 80 مغ : 16/10 E 108 /035.

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبىء:

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم.

القرص القابل للذوبان في الفم: يؤخذ بتركه يذوب تحت اللسان

بدون ماء أو بعد انحلاله في الماء. لدى الطفل، لابد أن يذوب في كوب من الماء قبل تناوله.

موانع الاستعمال:

- حساسية من الفلورو غلوسينول أو لإحدى المكونات.