

Eufor[®] 80 mg
Phloroglucinol dihydraté
Comprimé pelliculé

COMPOSITION ET PRESENTATION:

Phloroglucinol dihydraté80 mg

Excipients : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, povidone, stéarate de magnésium, opadry.

Excipient à effet notoire : lactose.

Eufor[®] 80 mg: Boite de 10 et 30 comprimés pelliculés.

INDICATIONS:

- Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.

- Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques.

- Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie.

- Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Posologie:

La posologie recommandée est de 160 mg par prise soit 2 comprimés de **Eufor[®] 80 mg** par prise, à renouveler 3 fois par jour en cas de nécessité, sans dépasser 6 comprimés par jour.

Mode d'administration:

Voie orale. Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau.

Respecter un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise.

CONTRE- INDICATIONS:

- Allergie au phloroglucinol ou à l'un des autres composants.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de l'app ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES:

L'association de ce médicament avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Ce médicament ne doit pas être utilisé au cours de la grossesse que si nécessaire; et il est déconseillé pendant l'allaitement.

EFFETS SUR LA CONDUITE DE VEHICULES ET L'UTILISATION DE MACHINES:

Sans objet.

EFFETS INDESIRABLES:

Manifestations cutanéomuqueuses et allergiques : boutons et/ou rougeurs sur la peau, rarement démangeaisons, exceptionnellement, brusque gonflement du visage et du cou, malaise brutal dû à la chute de la tension artérielle.

SURDOSAGE:

Sans objet.

CONSERVATION:

À conserver à une température ne dépassant pas les 30°C, à l'abri de l'humidité.

NE JAMAIS LAISSER CE MEDICAMENT À LA PORTEE DES ENFANTS.

Date de révision de la notice: Mai 2022.

D.E Algérie:

Eufor[®] 80 mg : 17/ 10 E 108 /035.

Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur:
Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir.

Ouled Fayet-Alger, Algérie.

أوفور® 80 مغ

فلوروغلوسينول ثنائي الإماهة

قرص مغلف

المورفين أو مشتقاتها بسبب تأثيرها التشنجي.

التركيب و الشكل :

فلوروغلوسينول ثنائي الإماهة..... 80 مغ.

الحمل و الإرضاع:

لا يجب إستعمال هذا الدواء أثناء الحمل إلا عند الضرورة.
لا ينصح بإستعمال هذا الدواء أثناء الإرضاع.

السواغات: لاكتوز أحادي الإماهة، سيلولوز ميكروكريستالين، كروسبوفيدون، بوفيدون، ستيرات المغنزيوم، أوبادري.

سواغ ذو تأثير معلوم: لاكتوز.

الآثار على السيقاة و استخدام الآلات:

بدون موضوع.

أوفور® 80 مغ : علبة تحتوي على 10 و 30 قرص مغلف.

دواعي الاستعمال:

الآثار غير المرغوب فيها :
ظواهر مخاطية جلدية و حساسية: البثور و / أو احمرار الجلد، نادرا الحكة، استثنائيا، تورم مفاجئ في الوجه والرقبة، وانزعاج مفاجئ بسبب انخفاض في ضغط الدم.

- علاج الأعراض المتعلقة باضطراب وظائف الجهاز الهضمي والقنوات الصفراوية.

- علاج المظاهر التشنجية المؤلمة و الحادة للمسالك البولية: المغص الكلوي.

- علاج المظاهر التشنجية المؤلمة الملاحظة في أمراض النساء.

- علاج مساعد للتقلصات أثناء الحمل بالجمع مع الراحة.

فرط الجرعة:

بدون موضوع.

الجرعة و طريقة الاستعمال:

الجرعة:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30° م في العلبة الأصلية، بعيدا عن الرطوبة.

لا يترك في متناول الأطفال.

الجرعة الموصى بها هي 160 مغ لكل جرعة، أي قرصين من أوفور® 80 مغ لكل جرعة، تكرر 3 مرات يوميا إذا لزم الأمر، دون تجاوز 6 أقراص في اليوم.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم. تؤخذ الأقراص مع كوب من الماء.
احترام فرق ساعتين على الأقل بين كل جرعة.

تاريخ مراجعة الوصفة: ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر:

أوفور® 80 مغ : 108 / 035 E 17/ 10.

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبيء:

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر.

موانع الاستعمال:

- حساسية من الفلوروغلوسينول أو لإحدى المكونات.

تحذيرات خاصة و إحتياطات الإستعمال:

يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز. لا ينصح باستخدامه عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الغلاكتوز، نقص اللاكتاز أو متلازمة سوء امتصاص الغلوكوز أو الغلاكتوز (أمراض وراثية نادرة).

التفاعلات الدوائية :

يجب تجنب إستعمال أوفور® مع المسكنات الرئيسية مثل