

Felcam® 0,5%

Piroxicam

Gel pour application locale

COMPOSITION ET PRESENTATION :

Piroxicam 0,5 g pour 100 g.

Excipients : carbomer 980, propylène glycol, éthanol 96%, alcool benzylique, triéthanolamine, hydroxyéthyl cellulose.

Excipient à effet notoire : propylène glycol.

Tube de 50 g.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Felcam® gel est réservé à l'adulte à partir de 15 ans, pour le traitement de courte durée des :

- Traumatismes bénins : entorse bénigne (foulure), contusion.
- Tendinites superficielles.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie:

2 à 4 applications de **Felcam® gel** par jour.

Mode d'administration :

Voie cutanée. Faire pénétrer le gel par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire. Bien se laver les mains après chaque utilisation.

En l'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement, consultez votre médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie à la substance active ou à l'un des excipients.
- Au-delà de 24 semaines d'aménorrhée (à partir du 6^{ème} mois de grossesse).
- Antécédent d'allergie ou d'asthme déclenché par la prise de piroxicam ou de substances d'activité proche telles que d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), acide acétylsalicylique.
- Peau lésée: dermatoses suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenir votre médecin en cas d'antécédent d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez. L'administration de ce médicament peut entraîner une crise d'asthme.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux. En cas d'application accidentelle, rincer abondamment à l'eau.
- L'apparition d'une éruption cutanée impose l'arrêt immédiat du traitement.
- Eviter toute application sous pansement occlusif.
- En cas d'utilisation fréquente, le port de gants est recommandé.
- Ce médicament contient du propylène glycol et peut provoquer des irritations de la peau.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

En raison du faible passage du piroxicam dans le sang lors d'un usage normal du gel, les interactions médicamenteuses signalées lors de l'administration du piroxicam par voie orale sont peu probables.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : avant le début du 6^{ème} mois de grossesse, ce médicament ne sera utilisé que sur les conseils de votre médecin et pendant une courte durée. L'utilisation prolongée est fortement déconseillée.

À partir du 6^{ème} mois et jusqu'à la fin de la grossesse, vous ne devez en aucun cas utiliser ce médicament.

Allaitement: par mesure de précaution, il convient d'éviter d'utiliser ce médicament pendant l'allaitement.

EFFET SUR LA CONDUITE DES VEHICULES ET L'UTILISATION DES MACHINES :

Sans objet.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Peuvent survenir des réactions allergiques cutanées avec ou sans démangeaisons, des réactions cutanées lors d'une exposition au soleil ou aux U.V, une inflammation de la peau, de l'eczéma et autres effets généraux des anti-inflammatoires (AINS).

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, il faut rincer abondamment à l'eau.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.

Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste I

Date de révision de la notice:

Mai 2022.

D.E Algérie :

Felcam® gel 0,5% : 17/21 A 005/035.

Fabricant, détenteur de D.E et conditionneur : Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir,
Ouled Fayet - Alger.

فالكام® 0,5%

بيروكسيكام

هلام للتطبيق الموضعي

التركيب و الشكل :

بيروكسيكام 0.5 غ ل 100 غ.
السواغات: كربومير 980، بروبيلان غليكول، إيثانول 96%، كحول بنزيلي، ثلاثي الإيثانولامين، هيدروكسي إيثيل السيلولوز.
سواغ ذو تأثير معلوم: بروبيلان غليكول.
أنبوب يحتوي على 50 غ.

دواعي الإستعمال :

يوصف فالكام® هلام للبالغين الذين يتجاوز عمرهم 15 سنة للعلاج في فترة قصيرة:
• أعراض الرضوض الخفيفة: الإلتواء، الكدمات.
• أعراض التهاب الأوتار السطحية.

الجرعة و طريقة الاستعمال:

الجرعة:

يطبق فالكام® هلام يومياً مرتين إلى 4 مرات في اليوم.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الجلد. فرك الهلام مع تدليك خفيف و توسيعه ليشمل المنطقة المؤلمة أو الملتهبة.
يجب غسل اليدين جيداً بعد كل استخدام.
إذا لم يطرأ تحسن بعد 5 أيام من العلاج، إستشر طبيبك.

موانع الاستعمال:

- حساسية ضد المادة الفعالة أو أحد السواغات.
- بعد 24 أسبوع من انقطاع الطمث (بداية من الشهر السادس من الحمل).
- سوابق من الحساسية أو الربو ناجمة عن اخذ البيروكسيكام أو الأدوية الأخرى المضادة للإلتهاب الغير ستيرويدي و الأستيل ساليسيليك.
- تلف الجلد: طفح جلدي، آفة مصابة، إكزيما، حرق أو جرح.

تحذيرات خاصة و احتياطات الاستعمال:

- أخبر الطبيب إذا كان لديك سوابق الربو المرتبط بالتهاب الأنف المزمن أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن أو الأورام الحميدة في أنفك. استعمال هذا الدواء قد يؤدي إلى نوبة ربو.
- لا يستعمل هذا الدواء على الأغشية المخاطية أو العينين، في حالة الاستخدام عن غير قصد يجب الشطف بالماء.
- في حالة ظهور طفح جلدي بعد استعمال الهلام، يجب وقف العلاج فوراً.
- يجب تجنب أي تطبيق تحت ضماد مسد.
- في حالة الاستخدام المتكرر، يوصى بارتداء القفازات.
- يحتوي هذا الدواء على البروبيلان غليكول الذي يمكن أن يسبب تهيج الجلد.

التفاعلات الدوائية:

هناك مرور ضعيف للبيروكسيكام في الدم بعد استعمال الهلام، و بالتالي من غير المحتمل أن تحدث تفاعلات دوائية.

الحمل و الإرضاع:

الحمل: قبل بداية الشهر السادس من الحمل، سيتم استخدام هذا الدواء فقط بناء على نصيحة طبيبك و خلال مدة قصيرة. الاستخدام المطول غير منصوح به.
من الشهر السادس حتى نهاية الحمل، يمنع استخدام هذا الدواء.
الإرضاع: كإجراء وقائي، يجب تفادي استخدام هذا الدواء أثناء الإرضاع.

الآثار على السيقانة و استخدام الآلات:

بدون ملاحظة.

الآثار غير المرغوب فيها:

تفاعلات الجلد التحسسية مع أو بدون حكة، تفاعلات الجلد عند التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق بنفسجية، التهاب الجلد، الأكزيما وغيرها من الآثار العامة لمضادات الالتهاب (غير الستيرويدية).

فرط الجرعة:

في حالة فرط الجرعة، يجب الغسل جيداً بالماء.

طريقة الحفظ:

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 30 °م، بعيداً عن الضوء و الرطوبة.
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة I

تاريخ مراجعة الوصفة:

جانفي 2019.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر:

فالكام® هلام 0,5% : 17/21A 005/ 035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبئ:

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر.