

Gripex® 10 mg/4 mg

Phényléphrine /chlorphéniramine

Gélule à microgranules à libération prolongée

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Phényléphrine (chlorhydrate) 10 mg.
Chlorphéniramine (maléate) 4 mg.

Excipients : saccharose, talc, PVP, éthylcellulose, PEG, mannitol, amidon de maïs, cellulose microcristalline, lactose.

Excipients à effet notoire : saccharose, lactose.

Boîte de 10 gélules à microgranules à libération prolongée.

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Traitement des symptômes dus au rhume, rhinite allergique (sensation de nez bouché, écoulement nasal clair) et sinusite.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :
Ce médicament est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 12 ans.

2 gélules de Gripex® par jour sont suffisantes et il convient d'espacer ces deux prises d'environ 12 heures.

Ne pas mâcher, ne pas écraser les microgranules.

La durée du traitement ne doit pas excéder 5 jours.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie aux constituants du produit, notamment aux antihistaminiques.

- Maladie grave du cœur.

- Certaines formes de glaucomes (augmentation de la pression dans l'œil).

- Difficultés à uriner d'origine prostatique ou non.

- Convulsion ancienne ou récente.

- Hypertension artérielle grave ou mal équilibrée par le traitement.

- Enfants de moins de 12 ans.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenez votre médecin en cas de :

- hypertension artérielle,

- maladie du cœur, hyperthyroïdie (excès d'hormones thyroïdiennes),

- troubles de la personnalité,

- diabète,

- prédisposition à la constipation, aux vertiges, et aux troubles urinaires,

- œil rouge, dur et douloureux avec vision floue.

Ce médicament contient du lactose et du saccharose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose ou au fructose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

- **Associations contre-indiquées :** décongestionnant

(par voie nasale et/ou orale), inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) non sélectifs : médicaments contre la dépression (iproniazide).

- **Associations déconseillées :** inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) sélectifs : médicaments contre la dépression (moclobémide, toloxatone), alcaloïde de l'ergot de seigle dopaminergiques (bromocriptine, cabergoline, lisuride pergolide), alcaloïde de l'ergot de seigle vasoconstricteur (dihydroergotamine, ergotamine, méthylergométrine, méthysergide), linézolide, alcool ou médicaments contenant de l'alcool.

- **Associations à prendre en compte :** dérivés morphiniques, anxiolytiques, atropine.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

La prise de ce médicament peut causer une somnolence.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Somnolence ou insomnie, sécheresse de la bouche, constipation, trouble de l'accommodation, rétention d'urine, hypotension orthostatique, troubles de l'équilibre, vertiges, tremblement, agitation, confusion des idées, palpitations, anxiété, maux de tête, sueurs, nausées, vomissements, réaction allergique, anomalie de la numération formule sanguine.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste I

Date de révision de la notice :

Mars 2022.

D.E Algérie : 19/99/22 A 047/035.

Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur :
Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir,
Ouled Fayet-Alger, Algérie.

Pharmalliance 

غريباكس[®] 10 مغ / 4 مغ فينيليفرين / كلورفينيرامين كبسولة ذات حبيبات ذات تحرير ممدد

التركيب والشكل:

فينيليفرين (هيدروكلوريد) 10 مغ.
كلورفينيرامين (ماليات) 4 مغ.
السواغات: ساكاروز، تالك، PVP، إيثيل سيلولوز، PEG، مانيتول، نشاء الذرة، سيلولوز ميكروكريستالين، لاكتوز.
سواغات ذات تأثير معلوم: ساكاروز، لاكتوز.
علبة تحتوي على 10 كبسولات ذات حبيبات ذات تحرير ممدد.

دواعي الاستعمال:

علاج الأعراض الناتجة عن نزلات البرد، التهاب الأنف التحسسي (الشعور بانسداد الأنف، إفرازات أنفية صافية) و التهاب الجيوب الأنفية.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

هذا الدواء مخصص للبالغين والأطفال فوق سن 12 عامًا.
كبسولتان كافيتان يوميًا ومن الضروري ترك 12 ساعة بين الجرعتين.
لا تمضغ، لا تسحق محتوى الكبسولة.
يجب ان لا تتجاوز مدة العلاج 5 أيام.

موانع الاستعمال:

- حساسية لمكونات المنتج وخاصة مضادات الهيستامين.
- أمراض القلب الخطيرة.
- أنواع معينة من الجلوكوما (زيادة الضغط في العين).
- صعوبة التبول من البروستاتا أم لا.
- تشنج قديم أو حديث.
- ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخطير أو غير المتوازن نتيجة العلاج.
- الأطفال أقل من 12 سنة.

تحذيرات واحتياطات الاستعمال:

• أخبر طبيبك في حالة:

- ضغط مرتفع.
- أمراض القلب وفرط نشاط الغدة الدرقية (زيادة هرمونات الغدة الدرقية).
- تقلبات الشخصية.
- داء السكري.
- التعرض المسبق للإمساك والدوخة واضطرابات المسالك البولية.
- احمرار في العين، تصلب، الم مع عدم وضوح الرؤية.
يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز والساكاروز. لا ينصح باستخدامه لدى المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الجالاكتوز أو الفركتوز أو نقص اللاكتاز أو الجلوكوز أو متلازمة سوء امتصاص الجالاكتوز أو نقص الساكاروز / الإيزومالتاز (أمراض وراثية نادرة).

التفاعلات الدوائية:

الجمع الممنوع: مزيلات الاحتقان (عن طريق الأنف و / أو الفم)، مثبطات مونامين او كسيداز غير الانتقائية: أدوية ضد الاكتئاب

(إبرونيازيد).

الجمع غير الموصى به: مثبطات مونامين او كسيداز الانتقائية: أدوية ضد الاكتئاب (موكلوبيد، تولوكساتون)، إرغوت قلويد الدوبامينجيك (بروموكريبتين، كابيرجولين، ليسورايد بيرجوليد)، إرغوت قلويد، مضيق للأوعية (ديهيدروارغوتامين، ميتروتامين، ميتروتامين) أو العقاقير التي تحتوي على الكحول.

الجمع الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار: سيمفاساتين (لعلاج ارتفاع مستويات الكوليسترول)، مثبطات المناعة، المضادات الحيوية (ريفامبيسين، إريثروميسين، كلاريثروميسين)، ديغوكسين، أدوية لفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز (ريتونافير) أو لعلاج الفطريات (كيتوكونازول).
الجمع الذي يتطلب احتياطات للاستخدام: مشتقات المورفين، مزيلات القلق، الأتروبيين.

لتجنب التفاعلات المحتملة بين العديد من الأدوية، يجب إبلاغ طبيبك أو الصيدلي عن أي علاج آخر.

الحمل والإرضاع:

لا ينصح باستخدام هذا الدواء اثناء الحمل والإرضاع.

الآثار على القيادة واستخدام الآلات:

قد يسبب تناول هذا الدواء النعاس.

الآثار غير المرغوب فيها:

نعاس أو أرق، جفاف الفم، إمساك، اضطراب في التكيف، احتباس البول، انخفاض ضغط الدم الوضعي، اضطراب التوازن، دوام، رعشة، هيجان، ارتباك في الأفكار، خفقان، قلق، صداع، تعرق، غثيان، قيء، رد فعل تحسسي، تعداد دم غير طبيعي.

فرط الجرعة:

في حالة تناول جرعة زائدة، استشر طبيبك.

طريقة الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 م°، بعيدا عن الضوء والرطوبة.
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة I.

تاريخ الوصفة: ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر: 19/99/22 A 047/035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل والمعين:

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد قايت - الجزائر.