

Gripex® Allergie 10mg

Cétirizine

Comprimé pelliculé sécable

COMPOSITION ET PRÉSENTATION:

Dichlorhydrate de cétirizine.....10 mg

Excipients: lactose, cellulose microcristalline, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, opadry blanc.

Excipient à effet notoire: lactose.

Boîte de 07 comprimés pelliculés sécables.

INDICATIONS:

Gripex® Allergie est indiqué chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans, dans le traitement :

- Des symptômes nasaux et oculaires des rhinites allergiques saisonnières et perannuelles.
- Des symptômes de l'urticaire chronique idiopathique.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Posologie :

Enfants de 6 à 12 ans: 5 mg, 2 fois par jour, soit 1/2 comprimé de Gripex® Allergie, 2 fois par jour.

Adultes et adolescents à partir de 12 ans: 10 mg par jour, soit 1 comprimé de Gripex® Allergie, une fois par jour.

Mode d'administration :

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec une boisson.

CONTRE-INDICATIONS:

- Allergie à la cétirizine, à l'un des excipients, à l'hydroxyzine ou aux dérivés de la pipérazine.
- Insuffisance rénale sévère.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

- La prudence est recommandée en cas de prise concomitante d'alcool.
- Ce médicament doit être administré avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.
- Des précautions doivent être prises chez les patients avec des facteurs prédisposant à la rétention urinaire (lésion de la moelle épinière, hyperplasie prostatique).
- Compte tenu de l'élimination essentiellement rénale de la cétirizine, la posologie doit être ajustée selon la fonction rénale.
- Il convient d'arrêter de prendre ce médicament 3 jours avant un test allergique cutané.
- Ce médicament contient du lactose, il n'est pas recommandé chez les patients souffrant de galactosémie

congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

Aucune interaction avec d'autres médicaments n'est attendue, cependant, il est recommandé d'informer votre médecin en cas de prise d'un autre médicament.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Ce médicament devra être administré uniquement si nécessaire et après avis médical.

EFFETS SUR LA CONDUITE DES VÉHICULES ET L'UTILISATION DES MACHINES:

Après la prise de ce médicament, les patients ressentant une somnolence ne devraient pas conduire de véhicules, ou utiliser des machines.

EFFETS INDÉSIRABLES:

Fréquents : somnolence, sensations vertigineuses, maux de tête, pharyngite, rhinite (chez l'enfant), diarrhée, nausées, sécheresse de la bouche, fatigue.

Peu fréquents : agitation, sensation de fourmillements dans les mains, douleurs abdominales, démangeaisons, éruption cutanée, et malaise.

SURDOSAGE:

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION:

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste II

Date de révision de la notice:

Mai 2022.

D.E Algérie:

Gripex® Allergie 10 mg: 17/01 A 003/035.

Fabricant, détenteur de D.E et conditionneur:

Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir - Ouled Fayet.

Alger, Algérie


Pharmalliance

غريباكس® حساسية 10 مغ

سيتيريزين

قرص مغلف قابل للتجزئة

التركيب و الشكل:

ثنائي كلور هيدرات السيتيريزين 10مغ.
السواغات: لاكتوز، سيلولوز ميكروكريستالين، سيليس
كولويدال لا مائي، ستيريرات المغنزيوم، اوبادراي أبيض.
سواغ ذو تأثير معلوم: لاكتوز.
علبة تحتوي على 7 أقراص مغلفة قابلة للتجزئة.

دواعي الاستعمال:

يشار غريباكس® حساسية عند البالغين والأطفال الذين يتجاوز
عمرهم 6 سنوات، في علاج:
• أعراض التهاب الأنف و العين خلال مظاهر الحساسية
الموسمية و الدائمة.
• أعراض الشرى المزمن مجهول السبب.

الجرعة و طريقة الاستعمال:

الاطفال ما بين 6 الى 12 سنة : 5 مغ مرتين في اليوم، اي
1/2 قرص من غريباكس® حساسية مرتين في اليوم.
البالغين و المراهقين ما فوق 12 سنة: 10 مغ في اليوم، اي
قرص من غريباكس® حساسية مرة في اليوم.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم.
يجب أخذ الاقراص مع مشروب.

موانع الاستعمال:

• فرط الحساسية للسيتيريزين، لأحد السواغات، للهيدروكسيكين
أو مشتقات البيبيرازين.
• القصور الكلوي الحاد.

تحذيرات خاصة و احتياطات الاستعمال:

• ينصح توخي الحذر في حالة الأخذ المتزامن للكحول.
• ينبغي وصف هذا الدواء بحذر لدى المرضى الذين يعانون
من الصرع أو خطر التشنجات الحركية.
• يجب أخذ الاحتياطات عند المرضى الذين يعانون من العوامل
المؤهلة لاحتباس البول (إصابة الحبل الشوكي ، تضخم
البروستات).
• بما أن السيتيريزين يقضى عليه أساسا عن طريق الكلى، يجب
تعديل الجرعة وفقا لوظيفة الكلى.
• يجب إيقاف هذا الدواء 3 أيام قبل إجراء اختبار حساسية الجلد.

قائمة II

تاريخ مراجعة الوصفة :

ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر:

غريباكس® حساسية 10 مغ: 035 / 01A 003 / 17.

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبي:

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت - الجزائر.