

Gripex® Toux grasse 2%

Carbocistéine

Solution buvable sans sucre pour enfant

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Carbocistéine.....2 g pour 100 ml de solution buvable.

Excipients : saccharinate de sodium, hydroxyéthyl cellulose, méthylparaben de sodium, arôme caramel vanille, hydroxyde de sodium.

Excipients à effet notoire : méthylparaben de sodium, sodium.

Flacon de 200 ml avec gobelet doseur gradué.

INDICATIONS :

Gripex® Toux grasse 2% est indiqué chez les enfants à partir de 2 ans dans le traitement des troubles de la sécrétion bronchique, notamment au cours des affections bronchiques aiguës : bronchite aiguë et épisode aigu des broncho-pneumopathies chroniques, toux grasse récente avec difficulté à expectorer.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

Un gobelet doseur de 5 ml contient 100 mg de carbocistéine.

- **Enfants de 2 à 5 ans :** 200 mg de **Gripex® Toux grasse 2%** par jour, répartis en 2 prises : verser la solution buvable **Gripex®** dans le gobelet jusqu'à la graduation de 5 ml, 2 fois par jour.

- **Enfants de plus de 5 ans :** 300 mg de **Gripex® Toux grasse 2%** par jour, répartis en 3 prises : verser la solution buvable **Gripex® Toux grasse 2%** dans le gobelet jusqu'à la graduation de 5ml, 3 fois par jour.

Ne pas dépasser 8 à 10 jours de traitement sans avis médical.

Ne pas doubler la dose pour compenser une dose oubliée.

Mode d'administration :

Voie orale. **Gripex® Toux grasse 2%** doit être pris de préférence en dehors des repas.

Rincez bien le gobelet après chaque utilisation.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie connue aux substances actives ou à l'un des excipients.
- Enfant de moins de 2 ans, en raison du risque d'aggravation de l'encombrement bronchique.
- En cas d'ulcère gastroduodéal actif.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

• Adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser ce médicament si :

- Vous (ou votre enfant) avez de la fièvre ou si votre expectoration est « verdâtre ».
- Vous (ou votre enfant) souffrez d'une maladie chronique des bronches ou des poumons.
- Vous (ou votre enfant) avez un ulcère digestif (saignements de l'estomac ou de l'intestin).

• Ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par la carbocistéine.

• Ce médicament contient du parahydroxybenzoate et peut provoquer des réactions allergiques.

• Ce médicament contient 13.85 mg de sodium par 5 ml, en tenir compte chez les patients suivant un régime hyposodé strict.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Associations contre-indiquées : ce médicament contient de la carbocistéine, ne pas l'associer avec d'autres médicaments qui en contiennent afin de ne pas dépasser les doses maximales conseillées.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, veuillez signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : l'utilisation de la carbocistéine ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

Allaitement : la prise de ce médicament est possible durant l'allaitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Sans objet.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Risque d'aggravation de l'encombrement bronchique chez le nourrisson, troubles digestifs tels que douleurs d'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, possibilité de saignement de l'estomac ou de l'intestin, réactions cutanées allergiques telles que démangeaisons, éruption de plaques ou de boutons sur la peau, urticaire, gonflement du visage et/ou du cou pouvant entraîner une difficulté à respirer (œdème de Quincke), éruption de plaques brunes ou violacées pouvant laisser une coloration sur la peau.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de la lumière.

NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Date de révision de la notice : Mai 2022.

D.E. Algérie :

Gripex® Toux grasse 2% : 18/ 20 D 041/ 035.

Fabricant, détenteur de D.E. et conditionneur : Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet, Alger - Algérie.

Pharmalliance

غريباكس® للسعال النخامي 2 %

كاربوسيسيتين

محلول للشرب بدون سكر للأطفال

التركيب و الشكل :

- لا ينبغي تناول أدوية مضادة للسعال أو دواء مجفف لإفرازات الشعب الهوائية خلال فترة العلاج بالكاربوسيسيتين.
- يحتوي هذا الدواء على باراهيدروكسي بنزوات وقد يسبب الحساسية.
- يحتوي هذا الدواء على 13.85 مغ من الصوديوم لكل 5 مل، والتي يجب مراعاتها عند المرضى الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صارمًا خال من الصوديوم.

كاربوسيسيتين.....2 غ في 100 مل من المحلول.
السواغات : سكارينات الصوديوم، هيدروكسي إيثيل السيلولوز، ميثيل بارابن الصوديوم، نكهة فانيليا الكراميل، هيدروكسيد الصوديوم.
سواغات ذات تأثير معلوم : ميثيل بارابن الصوديوم، الصوديوم.
زجاجة تحتوي على 200 مل مع كوب قياس مدرج.

دواعي الاستعمال :


الجمع والمنوع : يحتوي هذا الدواء على الكاربوسيسيتين، ولا يؤخذ بالمصاحبة مع الأدوية الأخرى التي تحتوي عليها، حتى لا يتجاوز الحد الأقصى من الجرعات الموصى به.
لتفادي التفاعلات الدوائية الممكنة ما بين عدة أدوية، يجب حتما إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

يوصف غريباكس® للسعال النخامي 2 % عند الأطفال ابتداء من عمر سنتين في علاج إفرازات الشعب الهوائية، وخاصة في حالات الإصابات الحادة للشعب الهوائية : التهاب الشعب الهوائية الحاد وحلقات من أمراض الرئة و القصبات الهوائية المزمنة، والسعال الحديث مع صعوبة إخراج البلغم.

الجرعة وطريقة الإستعمال :

الحمل والإرضاع :
الحمل : لا يجب أخذ الكاربوسيسيتين أثناء الحمل إلا إذا كان ذلك ضروريا.
الإرضاع : يمكن أخذ هذا الدواء خلال فترة الإرضاع.

كوب قياس 5 مل يحتوي على 100 مغ من الكاربوسيسيتين.
- **الأطفال من 2 إلى 5 سنوات :** 200 مغ من غريباكس® للسعال النخامي 2 % يوميا، مقسمة على جرعتين : سكب محلول غريباكس® في الكوب حتى التدرج 5 مل، مرتين يوميا.
- **الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات :** 300 مغ من غريباكس® للسعال النخامي 2 % يوميا، مقسمة على 3 جرعات : سكب محلول غريباكس® للسعال النخامي 2 % في الكوب حتى التدرج 5 مل، 3 مرات في اليوم.
لا يجب تجاوز 8 إلى 10 أيام من العلاج دون استشارة الطبيب.
لا تضاعف الجرعة لتعويض الجرعة المنسية.



طريقة الإستعمال :

الآثار غير المرغوب فيها :
خطر تفاقم احتقان الشعب الهوائية عند الرضع، اضطرابات الجهاز الهضمي مثل آلام في المعدة، غثيان، تقيؤ، إسهال، إمكانية حدوث نزيف المعدة أو الأمعاء، ردود فعل تحسسية في الجلد مثل الحكة، طفح جلدي، بقع أو بثور على الجلد، شرى، تورم في الوجه و/ أو الرقبة الذي قد تسبب صعوبة في التنفس (وذمة وعائية)، ظهور بقع بنية أو بنفسجية قد تترك لوثًا على الجلد.

عن طريق الفم. يفضل تناول غريباكس® للسعال النخامي 2 % خارج الوجبات.
يجب تنظيف الكوب جيدا بعد كل استخدام.

موانع الإستعمال :

طريقة الحفظ :
يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 °م، بعيدا عن الضوء.
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

- حساسية معروفة للمادة الفعالة أو لأحد السواغات.
- الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنتين، بسبب خطر تفاقم احتقان الشعب الهوائية.
- في حالة القرحة الهضمية النشطة.

تحذيرات و إحتياطات الإستعمال :

رقم مقرر التسجيل في الجزائر :
غريباكس® للسعال النخامي 2 % : 18/ 20D 041/ 035.
الصانع، صاحب مقرر التسجيل والمعبى :
فارماليانس.
حوش كوشي إدير، أولاد فايت - الجزائر.

• ينبغي إخبار الطبيب قبل استخدام هذا الدواء في حالة إذا :
- كنت (أو طفلك) تعاني من الحمى أو إذا كان البلغم "أخضر".
- كنت (أو طفلك) تعاني من مرض مزمن في الشعب الهوائية أو الرئتين.
- كنت (أو طفلك) مصابًا بقرحة هضمية (نزيف من المعدة أو الأمعاء).