Imuzole® 250 mg et 500 mg

Métronidazole

Comprimé pelliculé

COMPOSITION ET PRÉSENTATIONS :
Métronidazole ..... 250 mg..... 500 mg.
Excipients : lactose monohydrate, amidon de maïs, hydroxypropylcellulose, amidon prégélatinisé, crospovidone, stéarate de magnésium, silice colloïdale anhydre, cire de carnauba, opadry blanc.
Excipient à effet notoire : lactose monohydrate.
Boite de 20 comprimés pelliculés.

INDICATIONS ET POSOLOGIE :
• **Amibiases** :
Adultes : 1,5 g/jour en 3 prises, soit 1 comprimé d'**Imuzole®** 500 mg 3 fois par jour (matin, midi et soir).
Enfants à partir de 6 ans : 30 à 40 mg/kg/jour.
Pour un enfant de 25 kg, la dose est de 1 comprimé d'**Imuzole®** 250 mg, 3 fois/jour, ou 1 comprimé d'**Imuzole®** 500 mg, 2 fois/jour.
• **Trichomonases urogénitales :**
Chez la femme : soit un traitement mixte de 10 jours comportant 1 comprimé d'**Imuzole®** 250 mg, matin et soir et un traitement local, soit un traitement minute avec 4 comprimés d'**Imuzole®** 500 mg**,** en prise unique.
Chez l'homme : 1 comprimé d'**Imuzole®** 500 mg, en 2 prises pendant 10 jours.
• **Vaginites non spécifiques :**
1 comprimé d'**Imuzole®** 500 mg, en 2 prises pendant 7 jours.
Un traitement simultané du partenaire doit être pratiqué.
• **Lambliases :**
Adultes : 750 mg à 1 g/ jour, soit 3 comprimés d'**Imuzole®** 250 mg, ou 2 comprimés d'**Imuzole®** 500 mg pendant 5 jours consécutifs.
Enfants de 6 à 10 ans : 375 mg/jour.
Enfants de 10 à 15 ans : 500 mg/jour, soit 1 comprimé d'**Imuzole®** 250 mg, 2 fois par jour.
• **Traitement des infections à germes anaérobies (en 1ère intention ou en traitement de relais) :**
Adultes : 1 à 1,5 g/jour, soit 2 à 3 comprimés d'**Imuzole®** 500 mg par jour.
Enfants : 20 à 30 mg/kg/jour.
Pour un enfant de 25 kg, la dose est de 1 comprimé d'**Imuzole®** 250 mg, 2 à 3 fois/ jour.

MODE D'ADMINISTRATION :
Voie orale. Avaler les comprimés avec de l'eau.

CONTRE-INDICATIONS :
• Allergie au métronidazole, aux imidazolés ou à l'un des excipients.
• Enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme pharmaceutique.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
• **Prévenez votre médecin en cas de :**
- Troubles neurologiques, psychiatriques ou sanguins.
- Maux de ventre, anorexie, nausées, vomissements, fièvre, malaise, fatigue, jaunisse, urines foncées, selles de couleur mastic ou démangeaisons.

• L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :
• **Associations déconseillées** : alcool (boissons alcoolisées et médicaments contenant de l'alcool), busulfan, disulfirame.
• **Associations faisant l'objet de précautions d'emploi :** anticonvulsivants, rifampicine, lithium.
• **Association à prendre en compte :** fluoro-uracile.
Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :
Grossesse : ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse, si besoin.
Allaitement : il convient d'éviter l'allaitement pendant le traitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :
Des vertiges, troubles de la vue et des convulsions peuvent survenir, en tenir compte lors de la conduite de véhicules et de l'utilisation de machines.

EFFETS INDÉSIRABLES :
Douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, inflammation de la langue, perte d'appétit, bouffées de chaleur, démangeaison, éruption cutanée, œdème de Quincke, maux de tête, vertiges, convulsions, confusion, troubles de la vision, troubles sanguins, augmentation des enzymes du foie.

SURDOSAGE :
En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :
À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.
NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste I

Date de révision de la notice : Mai 2022.

D.E. Algérie :
Imuzole® 250 mg: 09/13F 039/ 035.
Imuzole® 500 mg: 11/13F 199/035.

Fabricant, détenteur de D.E et conditionneur :
Pharmalliance.
Domaine Kouchi Idir,
Ouled Fayet- Alger. Algérie.

Pharmalliance

PH160545 - C

إموزول® 250 مغ، 500 مغ
مترونيدازول
قرص مغلف

التركيب و الشكل :
مترونيدازول..... 250 مغ ..... 500 مغ
السواغات: لاكتوز أحادي الإماهة، نشاء الذرة، هيدروكسي بروبيل سيلولوز، نشاء القبل مهلّيم، كروسبوفيدون، ستيرات المغنيزيوم، سيليس كولوييدال اللامائي، صمغ الكرنوبا، أوبادراي أبيض.
سواغ ذو تأثير معلوم: لاكتوز أحادي الإماهة .
تحتوي العلبة على 20 قرص مغلف.

دواعي الاستعمال و الجرعة :
داء الأميبيا:
البالغين: 1,5 غ/اليوم في 3 جرعات، أي قرص من **إموزول®**500 مغ 3 مرات في اليوم (صباحا، ظهرا و مساءا).
الأطفال ابتداءا من 6 سنوات : 30 إلى 40 مغ/ كغ/ اليوم.
عند الأطفال الذين يزنون 25 كغ، الجرعة هي قرص واحد من **إموزول®**250 مغ، 3 مرات في اليوم، أو قرص واحد من **إموزول®** 500 مغ، مرتين في اليوم.
تريكوموناس البولي التناسلي :
- عند المرأة : إما علاج مزدوج لمدة 10 أيام يتضمن قرص واحد من **إموزول®**250 مغ، صباحا و مساءا بالإضافة إلى علاج موضعي، إما علاج فوري بأربع أقراص من **إموزول®**500 مغ، في جرعة واحدة.
- عند الرجل : قرص واحد من **إموزول®**500 مغ، في جرعتين لمدة 10 أيام.
التهاب المهبل غير المحدد :
قرص واحد من **إموزول®** 500 مغ في جرعتين لمدة 7 أيام. نفس العلاج يجب أن يطبق على الشريك.
داء اللامبلياز:
البالغين: 750 مغ الى 1 غ/ اليوم، أي 3 أقراص من **إموزول®** 250 مغ، أو قرصين من **إموزول®**500 مغ لمدة 5 أيام متتالية.
الأطفال من 6 الى 10 سنوات : 375 مغ/اليوم.
الأطفال من 10 الى 15 سنة : 500 مغ/اليوم، أي قرص واحد من **إموزول®** 250 مغ مرتين في اليوم.
معالجة الإصابات بالجراثيم اللاهوائية (كعلاج أولي أو كعلاج مداومة):
البالغين: من 1 إلى 1,5غ/ اليوم، أي من 2 الى 3 أقراص **إموزول®** 500 مغ في اليوم.
الأطفال: 20 إلى 30 مغ/ كغ/ اليوم.
عند الأطفال الذين يزنون 25 كغ، الجرعة هي قرص واحد من **إموزول®** 250 مغ، مرتين إلى 3 مرات في اليوم.

طريقة الإستعمال :
عن طريق الفم. تبلع الأقراص مع الماء.

موانع الاستعمال:
- حساسية للمترونيدازول، للإميدازول أولأحد السواغات.
- الطفل أقل من 6 سنوات بسبب الشكل الصيدلاني.

تحذيرات و احتياطات الاستعمال:
• **استشر طبيبك في حالة :**
- اضطرابات عصبية، نفسية و دموية.
- آلام في المعدة، فقدان الشهية، غثيان، قيء، حمى، توعك، تعب، يرقان، لون البول غامق، لون البراز صمغي أو حكة.
• لا ينصح باستعمال هذا الدواء عند الاشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الغالاكتوز، نقص اللاكتاز Lapp أو متلازمة سوء امتصاص الغلوكوز أو الغالاكتوز.
التفاعلات الدوائية :
•**الجمع غير الموصى به:** كحول (مشروبات كحولية و أدوية تحتوي على كحول)، بوسولفان، ديسولفيرام.
•**الجمع الذي يتطلب أخذ الإحتياط:** مضادات التشنج، ريفامبيسين، الليتيوم.
•**الجمع الذي يؤخذ بعين الإعتبار :** فلوروبوراسيل.
لتفادي التفاعلات المحتملة بين الأدوية المتعددة، يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي على أي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

الحمل والإرضاع:
الحمل : يمكن استعمال هذا الدواء إذا وجب الأمر أثناء الحمل.
الإرضاع : من الأحسن تجنب الإرضاع أثناء العلاج.

الآثار على السياقة و إستخدام الآلات :
ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار إمكانية حدوث دوار، اضطرابات في الرؤية و نوبات ارتجاج عند قيادة السيارات أو استخدام الآلات.

الآثار غير المرغوب فيها:
آلام في البطن، غثيان، قيء، اسهال، إلتهاب اللسان، فقدان الشهية، نفحات حرارة، حكة، طفح جلدي، وذمة وعائية، صداع، دوار، ارتجاج، إرتباك، اضطرابات في الرؤية، اضطرابات دموية، ارتفاع إنزيمات الكبد.

فرط الجرعة:
في حالة فرط الجرعة، يجب استشارة الطبيب.

الحفظ:
يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 30 °م، بعيدا عن الضوء و الرطوبة.
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة I

تاريخ مراجعة الوصفة :
ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر :
إموزول® 250 مغ : 035 /039 13F/ 09.
إموزول® 500 مغ : 035 /199 13F/ 11.

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبئ :
فارماليانس
حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر

Pharmalliance

PH60545 - C