

Larimel® 50mg

Acarbose
Comprimé

COMPOSITION ET PRESENTATION :

Acarbose.....50 mg

Excipients: cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, croscarmellose sodique, silice colloïdale anhydre.

Boîtes de 30 et 90 comprimés.

INDICATION :

Traitement du diabète non insulino-dépendant, en complément du régime alimentaire, en monothérapie comme en association aux autres thérapeutiques antidiabétiques.

Larimel® est un médicament réservé aux adultes.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

La posologie initiale recommandée est de 1 comprimé de **Larimel®** 50 mg, 3 fois par jour. Selon l'effet observé sur la glycémie, la posologie pourra être portée à 2 comprimés de **Larimel®** 50 mg, 3 fois par jour, parfois, jusqu'à 4 comprimés de **Larimel®** 50 mg, 3 fois par jour.

Mode d'administration:

Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau, au début des repas ou croqués avec les premières bouchées.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie à l'acarbose ou à l'un des constituants du médicament.
- Maladies chroniques associant des troubles de la digestion et de l'absorption, maladies inflammatoires de l'intestin, hernie intestinale majeure, obstruction intestinale partielle ou prédisposition à une obstruction intestinale (arrêt des matières et des gaz au niveau de l'intestin), ulcérations du colon.
- Insuffisance rénale sévère.
- Insuffisance hépatique sévère.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenez votre médecin en cas de troubles digestifs ou d'antécédents de chirurgie abdominale.
- Le régime alimentaire prescrit par votre médecin doit être suivi rigoureusement.
- Un suivi des enzymes hépatiques (transaminases) doit être considéré au cours des 6 à 12 premiers mois de traitement en particulier chez l'insuffisant hépatique.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

- Une hypoglycémie peut être observée en cas de prise concomitante d'un autre traitement antidiabétique (sulfamides hypoglycémisants, metformine, insuline), une adaptation de la posologie du traitement associé peut être nécessaire.
- L'administration simultanée de la colestyramine (utilisée pour traiter un taux élevé de cholestérol dans le

sang), d'absorbants intestinaux (utilisés pour traiter les diarrhées et les ballonnements) ou de médicaments à base d'enzymes digestives (utilisés pour faciliter la digestion) doit être évitée.

- La prise concomitante de néomycine orale pourrait augmenter la sévérité des troubles digestifs.
- Une adaptation de la posologie de la digoxine peut être nécessaire en cas de prise simultanée des deux traitements.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Grossesse: Il est recommandé d'arrêter ce médicament en cas de grossesse, un diabète doit nécessairement être traité par l'insuline durant toute la période de grossesse.
Allaitement: l'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée au cours de l'allaitement.

EFFETS SUR LA CONDUITE DES VEHICULES ET L'UTILISATION DES MACHINES :

Absence d'effets rapportés sur la vigilance.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Très fréquents : ballonnements abdominaux.

Fréquents : diarrhées, douleurs abdominales.

Peu fréquents : nausées, vomissements, digestion difficile, augmentation des enzymes du foie.

Rares : ictère (jaunisse), œdèmes.

Les effets indésirables gastro-intestinaux dépendent de la posologie et du régime alimentaire. Ils sont moins fréquents lorsque la dose est augmentée progressivement jusqu'à la dose souhaitée, ils diminuent généralement au cours du traitement et lorsque le régime hypoglucidique prescrit est respecté.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NE JAMAIS LAISSER CE MEDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste I.

Date de révision de la notice:

Mai 2022.

D.E. Algérie:

Larimel® 50 mg: 16/14A 136/035.

Fabricant, détenteur de D.E et conditionneur:

Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet-Alger, Algérie



Pharmalliance

لاريمال[®] 50 مغ أكاربوز قرص

التركيب و الشكل :

أكاربوز 50 مغ
السواغات: سيلولوز ميكروكريستالين، ستيبرات المغنيزيوم، كروسكارملوز الصوديوم، سيليس كلوبيدال اللاماني.
علب تحتوي على 30 و 90 قرص.

دواعي الاستعمال:

علاج مرض السكري غير المعتمد على الأنسولين بالإضافة إلى النظام الغذائي، وحده أو بالاشتراك مع علاجات مرض السكري الأخرى.
يوصف لاريمال[®] للكبار فقط.

الجرعة و طريقة الاستعمال:

الجرعة:

الجرعة الأولية المنصوح بها هي قرص واحد من لاريمال[®] 50 مغ ثلاث مرات يوميا. اعتمادا على التأثير الملحوظ على نسبة السكر في الدم، يمكن زيادة الجرعة إلى قرصين من لاريمال[®] 50 مغ ثلاث مرات يوميا، في بعض الحالات، يمكن الزيادة حتى 4 أقراص من لاريمال[®] 50 مغ ثلاث مرات يوميا.

طريقة الاستعمال:

يجب ابتلاع الأقراص مع القليل من الماء، مع بداية الوجبة أو يمتنع مع القطعات الأولى من الطعام.

موانع الاستعمال:

- حساسية للأكاربوز أو لأي مكون آخر.
- الأمراض المزمنة التي تشمل اضطرابات الهضم والامتصاص، أمراض الأمعاء الالتهابية، الفتق المعوي الرئيسي، انسداد الأمعاء الجزئي أو التعرض لانسداد الأمعاء (انحباس المواد والغازات في الأمعاء)، نقرح القولون.
- قصور كلوي حاد.
- قصور كبدي حاد.

التحذيرات و احتياطات الاستعمال:

- أخبر الطبيب إذا كان لديك مشاكل في الجهاز الهضمي أو سوابق من جراحة في البطن.
- يجب اتباع النظام الغذائي الذي يصفه طبيبك.
- ينبغي متابعة إنزيمات الكبد (الترانساميناز) في الدم خلال الأشهر 6 الأولى إلى 12 أشهر من بداية العلاج عند المرضى الذين يعانون من قصور كبدي.

التفاعلات الدوائية :

- يمكن ملاحظة نقص السكر في الدم عند اخذ مصاحب لمضادات مرض السكري الأخرى (سولفوناميدات مخفض للسكر في الدم ، ميتفورمين، الأنسولين)، وقد يكون من الضروري تعديل جرعة العلاج.

- يجب تجنب اخذ مصاحب للكلوسترامين (لعلاج ارتفاع الكوليستيرول في الدم)، الأدوية الماصة المعوية (لعلاج الإسهال والانتفاخ) أو أدوية التي تحتوي على إنزيمات الجهاز الهضمي (لمساعدة الهضم).
- الاستخدام المتزامن للنيوميسين عن طريق الفم قد يزيد من شدة الاضطرابات الهضمية.
- تعديل الجرعة ضروري إذا تم أخذ متزامن للديجوكسين.

الحمل و الإرضاع:

الحمل: ينصح وقف هذا الدواء أثناء الحمل، يستخدم الأنسولين لعلاج مرض السكري أثناء كل فترة الحمل.
الإرضاع: لا ينصح استخدام هذا الدواء أثناء الإرضاع.

الآثار على السيقانة و استخدام الآلات:

لم يتم الإبلاغ عن أي تأثير على اليقظة.

الآثار غير المرغوب فيها:

شائعة جدا: انتفاخ البطن.
شائعة: الإسهال، الأم البطن.
غير شائعة: غثيان، قيء، صعوبة في الهضم، زيادة إنزيمات الكبد.

تأثيرات:

تأثيرات: اليرقان، تورم.
تعتمد الآثار المعوية المعوية غير المرغوب فيها على الجرعة والنظام الغذائي. فهي أقل شيوعا عندما يتم زيادة الجرعة تدريجيا إلى الجرعة المطلوبة، تنخفض عموما أثناء العلاج وعند احترام حماية لمستوى السكر في الدم.

فرط الجرعة:

في حالة فرط الجرعة يجب استشارة الطبيب.

طريقة الحفظ:

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 30 °م، بعيدا عن الضوء والرطوبة.

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة I

تاريخ مراجعة الوصفة:

ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر:

لاريمال[®] 50 مغ: 14A 136/035/16

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المبيع:

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت - الجزائر.