

# Peptidac® 250 mg /133.5 mg

Alginate de sodium, Bicarbonate de sodium

Suspension buvable avec gobelet doseur

## COMPOSITION ET PRESENTATION :

Alginate de sodium ..... 250 mg.

Bicarbonate de sodium ..... 133.5 mg.

**Excipients:** Carbonate de calcium, carbomère, saccharinate de sodium, érythrosine, arôme fenouil, méthylparaben de sodium, propylparaben de sodium, hydroxyde de sodium.

Excipients à effet notoire: sodium, méthylparaben, propylparaben.

Flacon de 200 ml avec gobelet doseur.

## INDICATIONS:

Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

### Posologie :


1 dose de 10 ml (par le gobelet doseur) 3 fois par jour, après les 3 principaux repas et éventuellement au coucher.

Cette posologie peut être doublée en cas de reflux ou d'inflammation œsophagienne sévère.

### Mode d'administration:

Par voie orale. Il faut bien agiter le flacon avant emploi. Ce médicament doit être pris en dehors des repas .

Si les symptômes ne s'améliorent pas après 7 jours de traitement, il convient de prévenir votre médecin



## CONTRE-INDICATIONS:

Hypersensibilité connue aux substances actives ou à l'un des excipients.

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:

En cas de régime sans sel ou pauvre en sel, tenir compte de l'apport en sodium.

Ce médicament contient du calcium, des précautions doivent être prises chez les patients présentant une hypercalcémie, une néphrocalcinose et ayant des calculs rénaux.

Il est recommandé de suivre certaines règles hygiéno-diététiques au cours du traitement:

- éviter de se coucher immédiatement après les repas.
- ne pas dormir à plat ventre (surélever la tête du lit pour diminuer la fréquence du reflux nocturne).
- Éviter les travaux prolongés, buste penché en avant (ménage, jardinage).
- éviter les repas trop abondants.

- Ce médicament contient 348.45mg de sodium par dose (10ml). A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.

- Ce médicament contient du "parahydroxybenzoate" qui provoque des réactions allergiques .

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Les antiacides peuvent diminuer l'effet de nombreux autres médicaments, il est préférable d'espacer les prises de 2 heures entre ce médicament et un autre médicament à cause de la diminution de l'absorption de ce dernier.

**AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse et l'allaitement si besoin.

## EFFETS SUR LA CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES:

Aucune influence connue à ce jour.

## EFFETS INDÉSIRABLES:

**Très rares:** une réaction allergique à l'un des composants . Les symptômes peuvent se manifester par une éruption cutanée ,démangeaisons ,une difficulté respiratoire .

## CONSERVATION:

### Avant ouverture:

la suspension se conserve à température ne dépassant pas 30°C.

### Après ouverture:

la suspension se conserve au maximum 03 mois, à une température ne dépassant pas 25°C.

## Date de révision de la notice :

Mai 2022.

**D.E Algérie:** 16/10 G 054/035.

**Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur:**  
**Pharmalliance**

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet-Alger, Algérie.

  
Pharmalliance

## بييتيداك® 250 مغ / 133.5 مغ الجينات الصوديوم، بيكاربونات الصوديوم معلق للشرب مع سداة مدرجة

**التركيب:**  
الجينات الصوديوم ..... 250 مغ.  
بيكاربونات الصوديوم ..... 133.5 مغ.  
**السواغات:** كاربونات الكالسيوم، كاربومار، سكارينات الصوديوم، إريثروزين، عطر الثمر، ميثيل برابان الصوديوم، بروبيل برابان الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم.  
**السواغات ذات التأثير المعلوم:** صوديوم، ميثيل برابان، بروبيل برابان.  
قارورة بسعة 200 مل مع سداة مدرجة .

**التفاعلات الدوائية:**  
يمكن لمضادات الحموضة أن تخفف من مفعول بعض الأدوية الأخرى، ينصح بتباعد أوقات تناول هذا الدواء و دواء آخر بساعتين بسبب قلة امتصاصه.  
لتفادي حدوث أي تفاعلات بين الأدوية، يجب دائما إعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي بجميع الأدوية قبل الاستعمال.

**الحمل و الإرضاع:**  
يمكن وصف هذا الدواء خلال فترتي الحمل والإرضاع عند الحاجة.

**الآثار على القيادة واستخدام الآلات:**  
لا يعرف تأثير لهذا الدواء على القيادة واستخدام الآلات.

**الآثار غير المرغوب فيها:**  
نادرة جدا: حساسية لاحدى المكونات. قد تظهر اعراض طحح جلدي، حكة، صعوبة في التنفس.


**الحفظ:**  
قبل الفتح: درجة حرارة لا تتجاوز 30°م.  
بعد الفتح: يحتفظ لمدة ثلاثة أشهر كأقصى حد في درجة حرارة لا تتجاوز 25°م.

**تاريخ مراجعة الوصفة:**  
ماي 2022.

**رقم التسجيل في الجزائر:** 16/10 G 054/035

**الصانع ، صاحب مقرر التسجيل و المعبي:**  
فارماليانس.  
حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر.

**دواعي الاستعمال:**  
يستعمل هذا الدواء لعلاج أعراض مرض الارتجاع المعدي المريئي.



**الجرعة وطريقة الاستعمال:**  
**الجرعة :**

10 مل 3 مرات في اليوم بعد وجبات الطعام الرئيسية الثلاث، و عند الحاجة في المساء قبل النوم. يمكن استعمال ضعف هذه المقادير في حالات الارتداد و إلتهاب المريء الحاد.

**طريقة الاستعمال :**  
عن طريق الفم : يجب مخض القارورة جيدا قبل الاستعمال. يؤخذ هذا الدواء بعيدا عن الوجبات. إذا لم تتحسن الأعراض بعد 7 أيام من العلاج، يجب استشارة طبيبك.

**موانع الاستعمال:**  
ينصح بعدم استعمال هذا الدواء في حالة الحساسية ضد المواد الفعالة أو احد السواغات.

**احتياطات الاستعمال:**  
في حالة حمية غذائية خالية أو قليلة الملح، يجب الأخذ بعين الاعتبار محتواه من الملح.  
يحتوي هذا الدواء على الكالسيوم، ينبغي اتخاذ الاحتياطات عند المرضى الذين يعانون من فرط كالسيوم الدم، نيفروكالسينوز وحصى في الكلى.  
ينصح باحترام بعض القواعد الصحية و الغذائية عند تناول هذا الدواء:  
- تجنب النوم فورا عند انتهاء تناول الوجبات الغذائية.  
- عدم النوم على البطن يجب رفع الرأس عن مستوى السرير لتخفيف نسبة الارتداد أثناء الليل.  
- تجنب الأشغال التي تتطلب انحناء القسم الأعلى من الجسم