

# Soluxol® 0,3%

Ambroxol

Solution buvable

## COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Ambroxol ..... 0.3 g/100 ml.

**Excipients :** hydroxyéthyl cellulose, sorbitol, glycérol, saccharine de sodium, essence d'orange, menthol, acide benzoïque, propylène glycol.

Excipient à effet notoire : sorbitol.

Flacon de 200 ml.

## INDICATIONS :

Traitement des troubles de la sécrétion bronchique de l'adulte, notamment au cours des affections bronchiques aiguës et des épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques.

## POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Réservé à l'adulte.

### Posologie :

La posologie moyenne de **Soluxol®** est de 90 mg par jour en 2 prises, soit 1 cuillère à soupe de **Soluxol®**, matin et soir.

La durée de traitement ne dépassera pas 8 à 10 jours sans avis médical.

### Mode d'administration :

Voie orale.

## CONTRE-INDICATIONS :

Allergie connue à l'un des constituants.

**En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

## MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament peut provoquer des troubles digestifs légers (diarrhées).

Il est conseillé de ne pas prendre de médicaments antitussifs ou de médicaments asséchants les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

**En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.**

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs

médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

## GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement.

## CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Sans objet.

## EFFETS INDÉSIRABLES :

**Rares :** réactions allergiques, éruption au niveau de la peau, maux de tête, vertiges.

**Fréquence indéterminée :** choc anaphylactique, angio-œdème (gonflement rapide de la peau, du tissu sous-cutané, de la muqueuse ou du tissu sous-muqueux), démangeaisons.

Possibilité de survenue de troubles gastro-intestinaux mineurs à type de nausées, vomissements, douleurs au niveau de l'estomac. Il est conseillé de diminuer la posologie.

## SURDOSAGE :

Sans objet.

## CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas à 30°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

**NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.**

## Liste II

**Date de révision de la notice :** Mai 2022.

## D.E. Algérie :

**Soluxol® 0,3% :** 08/20D 064/ 035.

**Fabricant, détenteur de D.E. et conditionneur :**  
**Pharmalliance.**

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet - Alger, Algérie.

Pharmalliance 

## سلكسول® 0,3 %

أمبروكسول  
محلول للشراب

### التركيب و الشكل :

أمبروكسول ..... 0.3 غ/ 100 مل.  
السواغات : هيدروكي إيثيل السيلولوز، صوريبتول،  
جليسيرول، سكارين الصوديوم، عطر البرتقال، مونتول،  
حمض البنزويك، بروبيلان غليكول.  
سواغ ذو تأثير معلوم : صوريبتول.  
زجاجة تحتوي على 200 مل.

إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

### الحمل و الإرضاع :

من المستحسن عدم استخدام هذا الدواء أثناء فترة الحمل و الإرضاع.

الآثار على السياقة و استخدام الآلات:  
بدون ملاحظة.

### دواعي الاستعمال :

علاج اضطرابات إفراز القصب الهوائية للكبار البالغين،  
خاصة لعلاج الإصابات الحادة للقصب و الحالات الحادة  
لإلتهاب القصب و الرئتين المزمن.

### الجرعة و طريقة الاستعمال :

مخصص للبالغين.

### الجرعة :

الجرعة المتوسطة لسلكسول® هي 90 مغ في اليوم في جرعتين،  
أي ملعقة كبيرة من سلكسول® في الصباح و المساء.  
لا تتجاوز مدة العلاج 8 إلى 10 أيام دون استشارة طبية.

### طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم.

### موانع الاستعمال :

حساسية معروفة لأحد مكونات الدواء.

في حالة الشك، يجب حتما أخذ رأي الطبيب أو الصيدلي.

### فرط الجرعة :

بدون ملاحظة.

### طريقة الحفظ :

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 30° م، بعيدا عن  
الضوء و الرطوبة.

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

## قائمة II

### تحذيرات خاصة و احتياطات الاستعمال :

بسبب وجود الصوريبتول، يمكن لهذا الدواء أن يسبب  
اضطرابات هضمية خفيفة (إسهال).

يُنصح بعدم تناول الأدوية المضادة للسعال أو إفرازات الشعب  
الهوائية خلال فترة العلاج باستخدام هذا الدواء.

في حالة الشك، يجب حتما أخذ رأي الطبيب أو الصيدلي.

### التفاعلات الدوائية :

لتفادي التفاعلات الدوائية الممكنة ما بين عدة أدوية، يجب حتما

تاريخ مراجعة الوصفة : ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر :

سلكسول® 0.3 % : 08/20D 064/ 035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبئ :

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر.

PH60041 - D