

Sulrid® 0,5 g/100 ml

Sulpiride

Solution buvable

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Sulpiride.....0,5 g/100 ml.

Excipients : natrozol, acide chlorhydrique, saccharinate de sodium, acide citrique anhydre, parahydroxybenzoate méthyle, parahydroxybenzoate propyle, acide sorbique, arôme citron.

Excipients à effet notoire : parahydroxybenzoate.

Flacon en verre de 200 ml.

INDICATIONS :

Sulrid® 0,5% est utilisé dans :

- Le traitement des troubles graves du comportement (agitation, automutilation...) chez l'enfant.
- Le traitement de courte durée de l'anxiété chez l'adulte lorsque les traitements habituels sont insuffisants ou inefficaces.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

Une cuillère à café (5 ml) contient 25 mg de sulpiride.

Adulte : La posologie journalière est de 50 à 150 mg, soit 2 à 6 cuillères à café de **Sulrid® 0,5%**, pendant 4 semaines au maximum.

Enfant de plus de 6 ans : la posologie journalière est de 5 à 10 mg/kg.

Pour un enfant de 20 kg, la dose est de 4 à 8 cuillères à café de **Sulrid® 0,5%** par jour.

Mode d'administration :

Voie orale.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie au sulpiride ou à l'un des excipients.
- Tumeur dépendante de la prolactine (ex : adénome hypophysaire à prolactine et cancer du sein).
- Phéochromocytome connu ou suspecté.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Prévenez votre médecin en cas de :

diabète, facteurs de risque d'accident vasculaire cérébral, insuffisance rénale, épilepsie, maladie de Parkinson, tendance aux vertiges ou aux baisses de tension, survenue d'une fièvre inexplicable associée à une raideur musculaire.

• Ce médicament contient du parahydroxybenzoate et peut provoquer des réactions allergiques.

En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Associations déconseillées : les médicaments dopaminergiques (risque d'annulation de leurs effets), la méthadone, les antiparasitaires, certains antiépileptiques, médicaments contenant de l'alcool (risque de troubles graves du rythme cardiaque : torsades de pointe).

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement : l'allaitement est déconseillé pendant le traitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

L'attention est attirée chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les risques de somnolence suite à la prise de ce médicament.

EFFETS INDÉSIRABLES :

- **Fréquents :** quantité excessive de prolactine dans le sang, insomnie, somnolence, rigidité musculaire, tremblements, diminution et ralentissement des mouvements, constipation, augmentation des enzymes du foie, éruption de boutons ou de taches rouges sur la peau, écoulement anormal de lait en dehors des périodes d'allaitement, prise de poids.

- **Peu fréquents :** leucopénie (diminution du nombre de globules blancs), contractions musculaires en particulier des mâchoires, torticolis spasmodiques, sensation de vertiges lors du passage de la position allongée ou assise à la position debout, salivation excessive, arrêt des règles, troubles de l'érection (impuissance), absence de plaisir sexuel chez la femme (frigidité).

- **Rares :** mouvements involontaires des yeux (crises oculogyres).

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NE PAS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste I

Date de révision de la notice :

Mai 2022.

D.E. Algérie :

Sulrid® 0,5 g/100 ml : 08/16D 067/ 035.

Fabricant, détenteur de D.E et conditionneur :

Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir,
Ouled Fayet, Alger - Algérie.

PH60043 - C


Pharmalliance

سوليريد® 0,5 غ/100 مل

سولبيريد محلول للشرب

التركيب و الشكل :

لتفادي أي تفاعلات مع عدة أدوية، يجب حتما إبلاغ الطبيب أو الصيدلي على أي علاج يؤخذ في نفس الوقت.

سولبيريد.....0,5 غ/100 مل.
السواغات : ناتروزول، حمض الهيدروكلوريك، ساكارينات الصوديوم، حمض الستريك اللامائي، باراهيدروكسي بنزوات الميثيل، باراهيدروكسي بنزوات البروبيل، حمض الصوريك، نكهة الليمون.
سواغات ذات تأثير معلوم : باراهيدروكسي بنزوات زجاجة تحتوي على 200 مل.

الحمل و الإرضاع:

الحمل: لا يستعمل هذا الدواء أثناء الحمل إلا باستشارة طبيبك.
الإرضاع: الإرضاع غير منصح به أثناء العلاج.

سياقة السيارات و استعمال الآلات:

يتم لفت إنتباه سائقي السيارات ومستعملي الآلات إلى مخاطر النعاس المرتبطة باستخدام هذا الدواء.

الآثار غير المرغوب فيها:

- شائعة : كمية كبيرة من البرولاكتين في الدم، أرق، نعاس، صلابة عضلية، رعشة، انخفاض و تباطؤ الحركات، إمساك، زيادة إنزيمات الكبد، طفح البثور أو بقع حمراء على الجلد، تدفق غير طبيعي للحليب خارج فترات الإرضاع، زيادة الوزن.
- غير شائعة : نقص الكريات البيضاء (انخفاض خلايا الدم البيضاء)، تقلص العضلات خاصة الفكين، صعر تشنجي، الشعور بدوار عند الانتقال من وضعية التمدد أو الجلوس إلى الوقوف، إفراز اللعاب، وقف الحيض، اضطراب الانتصاب (العجز الجنسي)، عدم المتعة الجنسية لدى النساء (البرود الجنسي).
- نادرة : حركات لا إرادية للعيون (أزمات تدوير المقلة).

فرط الجرعة :

في حالة فرط الجرعة، يجب استشارة الطبيب.

الحفظ :

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 25 °م، بعيدا عن الضوء و الرطوبة.
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة I

تاريخ مراجعة الوصفة:

ماي 2022.

رقم التسجيل في الجزائر:

سوليريد® 0,5 غ/100 مل : 08/16D 067/ 035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبيء :

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر.

دواعي الاستعمال:

يستعمل سوليريد® 0,5 % في :

- علاج اضطرابات سلوكية حادة (هيجان، إيذاء النفس...) عند الطفل.
- علاج قصير الأمد للقلق عند البالغ عندما يكون العلاج المعتاد غير كاف أو غير فعال.

الجرعة و طريقة الاستعمال:

الجرعة:

ملعقة صغيرة (5 مل) تحتوي على 25 مغ من السولبيريد.
عند البالغ : الجرعة اليومية من 50 إلى 150 مغ ما يعادل 2 إلى 6 ملاعق صغيرة من سوليريد® 0,5 %، لمدة 4 أسابيع على الأكثر.
عند الطفل الأكثر من 6 سنوات : الجرعة اليومية من 5 إلى 10 مغ/كغ. للطفل الذي يزن 20 كغ، الجرعة الموصى بها هي 4 إلى 8 ملاعق صغيرة من سوليريد® 0,5 % في اليوم.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم.

موانع الاستعمال :

- حساسية للسولبيريد أو لأحد السواغات.
- ورم يعتمد على البرولاكتين (مثل : ورم الغدة النخامية البرولاكتيني و سرطان الثدي).
- ورم القواتم معروف أو مشتبه.
في حالة الشك، يجب حتما أخذ رأي الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات و احتياطات الاستعمال:

أخبر طبيبك في حالة :

داء السكري، عوامل خطر السكتة الدماغية، القصور الكلوي، الصرع، مرض باركنسون، دوخة أو انخفاض ضغط الدم، حدوث حمى غير مبررة مرفوقة بتصلب العضلات.
- يحتوي هذا الدواء على باراهيدروكسي بنزوات الذي يمكن ان يسبب الحساسية.
في حالة الشك، يجب حتما أخذ رأي الطبيب أو الصيدلي.

التفاعلات الدوائية:

جمع غير منصح به : أدوية الدوبامين (خطر إلغاء آثارها)، الميتادون، الأدوية المضادة للطفيليات، بعض مضادات الصرع، الأدوية التي تحتوي على الكحول (خطر حدوث اضطرابات خطيرة في معدل ضربات القلب : ضفيرة النتوءات).