

Vastor® 20 mg

Trimétazidine

Comprimé pelliculé

COMPOSITION ET PRÉSENTATION:

Trimétazidine (sous forme de dichlorhydrate) 20 mg.

Excipients: cellulose microcristalline, amidon de maïs prégélatinisé, mannitol, povidone, glycérol, stéarate de magnésium, opadry II marron, cire de carnauba.

Boîte de 60 comprimés pelliculés.

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Vastor® est indiqué dans le traitement symptomatique de l'angine de poitrine (douleur de la poitrine due à une maladie coronarienne) chez l'adulte insuffisamment contrôlé, ou présentant une intolérance aux traitements antiangineux en association à d'autres médicaments.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

La posologie recommandée est de 1 comprimé de **Vastor® 20 mg**, 3 fois par jour.

En cas d'insuffisance rénale modérée (clairance entre 30-60 ml/min), la posologie est de 1 comprimé de **Vastor® 20 mg** par jour, matin et soir.

Chez les patients de plus de 75 ans ou souffrant de problèmes rénaux, le médecin traitant peut ajuster la posologie recommandée.

Mode d'administration :

Voie orale. Le comprimé de **Vastor®** se prend au cours des repas, avec un verre d'eau.

CONTRE-INDICATIONS :

- Allergie à la trimétazidine ou à l'un des composants.
- Maladie de Parkinson, symptômes parkinsoniens, tremblements, syndrome des jambes sans repos et autres anomalies motrices reliées.
- Insuffisance rénale sévère.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenez votre médecin en cas de :

- douleur thoracique (angine de poitrine).
- baisse de la pression artérielle.
- survenue de symptômes parkinsoniens (raideur des bras et des jambes, ralentissement des mouvements, tremblements, instabilité posturale avec démarche déséquilibrée et une tendance à trainer les pieds).

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Aucune interaction médicamenteuse n'a été identifiée.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs

médicaments, veuillez signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et durant l'allaitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Des cas de vertiges et de somnolence peuvent survenir au cours du traitement et affectant l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Fréquents : vertiges, maux de tête, douleurs abdominales, diarrhée, digestion difficile, vomissements, éruption cutanée, démangeaisons, urticaire et sensation de fatigue.

Rares : battements rapides ou irréguliers du cœur, battements cardiaques extrasystoliques, hypotension orthostatique (chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout) pouvant s'accompagner de vertiges, évanouissement, malaise, chute, rougeurs brusques du visage.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de l'humidité et de la lumière.

NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste II.

Date de révision de la notice : Mai 2022.

D.E Algérie :

Vastor® 20 mg : 07/06J 107/035.

Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur : Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet.
Alger, Algérie.

فاستور® 20 مغ

تريميزايدين
قرص مغلف

التفاعلات الدوائية :

لم يتم تحديد أي تفاعلات دوائية.
لتجنب التفاعلات المحتملة بين عدة أدوية، يجب إبلاغ طبيبك أو الصيدلي عن أي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

الحمل والإرضاع :

من المستحسن عدم استعمال هذا الدواء أثناء الحمل و الإرضاع.

الآثار على السيقا واستخدام الآلات :

يمكن حدوث دوخة ونعاس أثناء أخذ العلاج قد تؤثر على القدرة على القيادة واستخدام الآلات.

الآثار غير المرغوب فيها :

الشائعة: دوخة، صداع، آلام البطن، إسهال، صعوبة الهضم، قيء، طفح جلدي، حكة، شرى والشعور بالتعب.
النادرة: نبضات قلب سريعة أو غير منتظمة، الانقباض المبكر للأذين أو البطين، انخفاض ضغط الدم عند تغيير الوضعية (انخفاض ضغط الدم عند الوقوف) قد يكون مصحوبًا بدوار، إغماء، شعور بالضيق، سقوط، احمرار الوجه المفاجئ.

فرط الجرعة :

في حالة فرط الجرعة، استشر طبيبك.

طريقة الحفظ :

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30° م، بعيدا عن الضوء والرطوبة.

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة II.

تاريخ مراجعة الوصفة: ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر :

فاستور 20 مغ : 07/06J 107/035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبي:

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت - الجزائر

Pharmalliance

التركيب والشكل :

تريميزايدين (على شكل الكلور هيدرات) 20 مغ.
السواغات: سيلولوز ميكروكريستالين، نشاء الذرة قبل المهيلم، مانيتول، بوفيدون، غليسيرول، ستيرات المغنيزيوم، أوبادراي II بني، شمع الكرنوبا.
علبة تحتوي على 60 قرص مغلف.

دواعي الاستعمال :

يستعمل فاستور® لعلاج أعراض الذبحة الصدرية (ألم في الصدر بسبب مرض الشريان التاجي) عند البالغين الذين لا يخضعون لرقابة كافية، أو الذين لا يتحملون العلاج المضاد للذبحة الصدرية المجموع مع أدوية أخرى.

الجرعة وطريقة الاستعمال :

الجرعة :

الجرعة الموصى بها هي قرص واحد من فاستور® 20 مغ، 3 مرات يوميًا.

في حالة القصور الكلوي المعتدل (تصفية الكرياتينين ما بين 30-60 مل / دقيقة)، الجرعة هي قرص واحد من فاستور® 20 مغ يوميًا، صباحًا ومساءً.

عند المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا أو الذين يعانون من مشاكل في الكلى، قد يقوم الطبيب المعالج بتعديل الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم. يؤخذ قرص فاستور 20 مغ أثناء الوجبات، مع كوب من الماء.

موانع الاستعمال :

- حساسية للتريميزايدين أو أي من المكونات.
- مرض الباركنسون، أعراض الشلل الارتعاشي، ارتعاشات، متلازمة تلملم الساقين وغيرها من التشوهات الحركية ذات الصلة.
- قصور كلوي حاد.

تحذيرات واحتياطات الاستعمال :

•أخبر طبيبك في حالة :

- ألم في الصدر (ذبحة صدرية).
- انخفاض في ضغط الدم.
- أعراض الشلل الارتعاشي (تصلب في الذراعين والساقين، بطء الحركة، ارتعاش، عدم الاستقرار الموضعي، مشية غير متوازنة وميل لسحب القدمين).

PH60267 - C