

Zexil® 50 mg

Sertraline

Gélule

COMPOSITION ET PRESENTATION:

Sertraline50 mg
Excipients: povidone, alcool isopropyle, microgranules neutres de saccharose, amidon de maïs.
Excipient à effet notoire: saccharose.
Boite de 30 gélules.

INDICATIONS ET POSOLOGIE:

Adultes :

• **Dépression, prévention des récurrences de la dépression et trouble obsessionnel compulsif (TOC) :** la dose efficace habituelle est 1 gélule de Zexil® 50 mg par jour.

• **Trouble panique, trouble anxiété sociale et état de stress post-traumatique :** la dose initiale est de 25 mg/jour, augmentée après une semaine à 50 mg par jour, soit 1 gélule de Zexil® 50 mg par jour.

Enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans :

• Troubles obsessionnels compulsifs (TOC):

- Enfants âgés de 6 à 12 ans: la dose initiale est de 25 mg/ jour, qui peut être augmentée après une semaine à 50 mg/jour, soit 1 gélule de Zexil® 50 mg par jour.

- Adolescents âgés de 13 à 17 ans: la dose initiale est de 1 gélule de Zexil® 50 mg par jour.

En cas de réponse insuffisante, une augmentation secondaire de la dose est possible par paliers de 50 mg sur une période de plusieurs semaines si nécessaire. La dose maximale recommandée est de 200 mg par jour.

MODE D'ADMINISTRATION :

Voie orale. Les gélules sont à prendre une fois par jour, pendant les repas, le matin ou le soir.

CONTRE-INDICATIONS:

Allergie connue à la sertraline ou à l'un des composants.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLI:

• L'utilisation des antidépresseurs est déconseillée avant l'âge de 18 ans.

• Des précautions sont nécessaires en cas d'épilepsie (même ancienne), de prédisposition aux hémorragies, d'insuffisance hépatique, de glaucome ou de diabète.

• Evitez la prise de boissons alcoolisées et le jus de pamplemousse pendant le traitement.

• En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et durant l'allaitement.

EFFETS SUR LA CONDUITE DES VEHICULES ET L'UTILISATION DES MACHINES :

Ce médicament peut affaiblir les facultés mentales et physiques nécessaires à la conduite et à la manipulation des machines.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Fréquents : nausées, vomissements, constipation ou diarrhée, anorexie ou augmentation de l'appétit, insomnies, maux de tête, baisse de la libido et échec à l'éjaculation, trouble de l'attention, vertiges, troubles visuels, agitation pénible, besoin impérieux de bouger et des réactions de sevrage secondaires à l'arrêt du traitement, particulièrement si le traitement est interrompu brutalement.

SURDOSAGE:

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION:

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NE PAS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste I

Date de révision de la notice:

Mai 2022.

D.E Algérie:

Zexil® 50 mg : 11/16 A 099/035.

Fabricant, détenteur de D.E et conditionneur: Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet - Alger, Algérie.

زيكسيل[®] 50 مغ

سرترالين

كبسولة

الجالاكتوز أو نقص سوكراز ايزومالتاز.

التركيب و الشكل:

سرترالين.....50 مغ

السواغات: بوفيدون، كحول ايزوبروبيل، حبيبات السكاروز المحايذة، نشاء الذرة.

سواغ ذو تأثير معلوم : ساكاروز.

علبة تحتوي على 30 كبسولة.

التفاعلات الدوائية:

لتفادي تفاعلات دوائية ممكنة ما بين عدة أدوية، يجب حتما إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

الحمل و الإرضاع:

من المستحسن عدم استخدام هذا الدواء أثناء الحمل والإرضاع.

الآثار على السياقة و إستخدام الآلات :

هذا الدواء قد يؤثر على قدراتك العقلية أو البدنية المطلوبة لتشغيل الآلات أو قيادة السيارات.

الآثار غير المرغوب فيها:

الشائعة : الغثيان، القيء، الإمساك، الإسهال، فقدان الشهية، زيادة الشهية، الأرق، الصداع، انخفاض الرغبة الجنسية والفشل في القذف، نقص الانتباه، الدوخة، اضطرابات بصرية، الثوران، حاجة ماسة للتحرك وردود فعل الانسحاب بسبب التوقف عن العلاج، خاصة إذا تم إيقافه فجأة.

فرط الجرعة:

في حالة فرط الجرعة، يجب استشارة الطبيب.

الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 ° م، بعيدا عن الحرارة والرطوبة.

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة |

تاريخ مراجعة الوصفة:

ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر:

زيكسيل[®] 50 مغ: 11/ 16A 099/ 035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبي:

فارماليانس.

حوش كوشي ايدير، أولاد فايت - الجزائر

دواعي الاستعمال و الجرعة:

عند البالغين:

• **توقى تكرار الاكتئاب والوسواس القهري:** الجرعة الفعالة المعتادة هي كبسولة واحدة من زيكسيل[®] 50 مغ في اليوم.

• **اضطراب الهلع، اضطراب القلق الاجتماعي و حالة القلق ما بعد الصدمة:** الجرعة الأولية هي 25 مغ في اليوم، والتي يمكن زيادتها بعد أسبوع واحد إلى 50 مغ في اليوم، أي كبسولة واحدة من زيكسيل[®] 50 مغ في اليوم.

عند الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 سنة:

• **اضطرابات الوسواس القهري:**

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 سنة: الجرعة الأولية هي 25 مغ في اليوم، ويمكن زيادتها إلى 50 مغ في اليوم، أي كبسولة واحدة من زيكسيل[®] 50 مغ في اليوم.

- المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 سنة: الجرعة الأولية هي كبسولة واحدة من زيكسيل[®] 50 مغ في اليوم.

في حالة الاستجابة غير الكافية، يمكن زيادة الجرعة الثانوية بخطوات 50 مغ على مدى عدة أسابيع إذا لزم الأمر. الجرعة القصوى الموصى بها هي 200 مغ يوميا.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم. تؤخذ الكبسولات مرة في اليوم، أثناء وجبات الطعام، في الصباح أو المساء.

موانع الاستعمال:

- حساسية معروفة للسرترالين أو أحد المكونات .

التحذيرات و احتياطات الاستعمال:

• لا ينصح باستخدام مضادات الاكتئاب قبل عمر 18 عامًا.

• يجب أخذ الاحتياطات في حالة الصرع، عرضة لنزيف، قصور الكبد، الزرق أو مرض السكري.

• يجب تجنب تناول المشروبات الكحولية وعصير الجريب فروت أثناء العلاج.

• بسبب وجود السكاروز، لا ينبغي أن يستخدم هذا الدواء في حالات عدم تحمل الفركتوز، وسوء امتصاص الجلوكوز