

ZYNAX® 250 mg, 500 mg

Céfuroxime

Comprimé pelliculé

COMPOSITION ET PRÉSENTATIONS :

Céfuroxime (sous forme de céfuroxime axétil)
.....250 mg.....500 mg.

Excipients : cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, lauryl sulfate de sodium, aérosil, huile de coton hydrogénée, opadry.
Boîtes de 08 et 14 comprimés pelliculés.

INDICATIONS :

Zynax® comprimé est utilisé chez l'adulte et l'enfant à partir de 6 ans pour traiter les infections :

- de la gorge.
- des sinus.
- de l'oreille moyenne.
- des poumons ou des bronches.
- des voies urinaires.
- de la peau et des tissus mous.

Zynax® peut également être utilisé pour traiter la maladie de Lyme (une infection transmise par des parasites appelés tiques).

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

Adultes :

La dose recommandée de **Zynax®** est 250 mg à 500 mg, 2 fois par jour, en fonction de la sévérité et du type d'infection.

Enfants à partir de 6 ans :

La dose recommandée de **Zynax®** est de 10 mg/kg à 15 mg/kg, 2 fois par jour (soit 125 mg à 250 mg, 2 fois/jour au maximum) en fonction de la sévérité et du type d'infection.

Respecter strictement la prescription médicale, et en cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Mode d'administration :

Voie orale. Avalez les comprimés sans les croquer, avec un peu d'eau, après un repas.

CONTRE-INDICATIONS:

- Allergie à la céfuroxime ou à l'un des excipients.
- Allergie à un autre antibiotique de la famille des céphalosporines.
- Chez l'enfant de moins de 6 ans, en raison de la forme comprimé qui ne lui est pas adaptée.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Avant de prendre ce traitement, il est recommandé de prévenir votre médecin si une réaction allergique s'est présentée lors d'un traitement antibiotique antérieur, ou si vous prenez une pilule contraceptive.
- Toute manifestation allergique en cours de traitement impose son arrêt.
- La survenue de diarrhée au cours d'un traitement antibiotique ne doit pas être traitée sans avis médical.

- En cas de maladie des reins, il est indispensable d'adapter la posologie.

- Certains résultats d'examens de laboratoire peuvent être faussés (Test de Coombs, glycosurie).

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

Prévenez votre médecin, en cas de traitement en cours par un autre antibiotique ou un diurétique.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : les femmes enceintes doivent consulter leur médecin avant de prendre ce médicament.

Allaitement : l'allaitement est possible avec la prise de ce médicament. Si le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhée, éruption sur la peau, candidose, avertissez votre médecin.

EFFETS SUR LA CONDUITE DES VÉHICULES ET L'UTILISATION DES MACHINES :

Des sensations vertigineuses pouvant altérer la vigilance peuvent apparaître lors du traitement.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Fréquents : troubles gastro-intestinaux (diarrhées, nausées, douleurs abdominales), maux de tête, augmentation de certains globules blancs dans le sang, élévation de certaines enzymes du foie et apparition d'une infection à candida.

Peu fréquents : sensations vertigineuses, éruptions cutanées, vomissements, diminution de certains globules blancs dans le sang, diminution des plaquettes.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste I.

Date de révision de la notice : Mai 2022.

D.E Algérie :

Zynax® 250 mg: 20/ 13B 208 / 035.

Zynax® 500 mg: 20/ 13B 296 / 035.

Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur :
Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet-Alger, Algérie.

زيناكس® 250 مغ، 500 مغ

سيفوروكسيم
قرص مغلف

التركيب و الشكل :

سيفوروكسيم (على شكل سيفوروكسيم أوكسيتيل) 250.....مغ.....500 مغ.
السواغات : سيلولوز مكروكريستالين، كرسكرميلوز
صوديوم، لورييل سلفات الصوديوم، أيروزيل، زيت القطن
مهدرج، أوبادراي.
علب تحتوي على 08 و 14 قرص مغلف.

الحمل و الإرضاع :

الحمل : يجب على النساء الحوامل استشارة الطبيب قبل أخذ هذا الدواء.
الإرضاع : من الممكن الإرضاع أثناء فترة العلاج، إذا كان المولود الجديد لديه اضطرابات مثل الإسهال، الطفح الجلدي، داء المبيضات، من الضروري الإتصال بالطبيب.

الآثار على القيادة و استخدام الآلات :

تناول هذا الدواء يمكن أن يسبب دوام الذي قد يؤثر على اليقظة.

الآثار غير المرغوب فيها :

الشائعة : اضطرابات الجهاز الهضمي (الإسهال، الغثيان، آلام البطن)، الصداع، زيادة بعض خلايا الدم البيضاء في الدم، ارتفاع بعض أنزيمات الكبد و ظهور عدوى المبيضات.
غير الشائعة : الدوخة، الطفح الجلدي، التقيؤ، انخفاض خلايا الدم البيضاء، انخفاض عدد الصفائح الدموية.

فرط الجرعة :

في حالة فرط الجرعة، استشر طبيبك.

طريقة الحفظ :

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 °م بعيدا عن الضوء والرطوبة.
لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة I.

تاريخ مراجعة الوصفة : ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر :

زيناكس® 250 مغ : 20/ 13B 208 / 035

زيناكس® 500 مغ : 20/ 13B 296 / 035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبي :
فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت - الجزائر.

دواعي الاستعمال :

يستخدم زيناكس® لدى البالغين والأطفال ابتداء من سن 6 سنوات لعلاج التهابات :

• الحلق.

• الجيوب الأنفية.

• الأذن الوسطى.

• الرئتين أو القصبات الهوائية.

• المسالك البولية.

• الجلد والأنسجة الرخوة.

يمكن استخدام زيناكس® أيضا لعلاج داء لايم (عدوى تنتقل عن طريق طفيليات تسمى القراد).

الجرعة و طريقة الاستعمال :

الجرعة :

البالغين :

الجرعة الموصى بها من زيناكس® هي 250 مغ إلى 500 مغ، مرتين في اليوم، حسب شدة ونوع العدوى.
الأطفال ابتداء من 6 سنوات :

الجرعة الموصى بها من زيناكس® هي 10 مغ/كغ إلى 15 مغ/كغ، مرتين في اليوم (أي 125 مغ إلى 250 مغ، مرتين في اليوم على الأكثر) حسب شدة ونوع العدوى.

يجب احترام صارم للوصفة الطبية. في حالة أي شك، من الضروري استشارة طبيبك أو الصيدلي.

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم. هذا الدواء يبلع مع القليل من الماء، بعد الوجبات، وينصح بعدم مضغه.

موانع الاستعمال :

- حساسية للسيفوروكسيم أو لأحد السواغات.
- حساسية لمضاد حيوي آخر ينتمي لعائلة السيفالوسبورين.
- عند الأطفال الأقل من 06 سنوات وذلك لأن هذا الشكل الصيدلاني (قرص) ليس مناسب لهم.

تحذيرات خاصة و احتياطات الاستعمال :

- قبل أخذ هذا الدواء، ينصح بإعلام طبيبك، في حالة ظهور حساسية أثناء علاج سابق أو إذا كنت تأخذ حبوب منع الحمل.
- في حالة ظهور حساسية أثناء فترة العلاج، يجب توقيف أخذ الدواء.
- في حالة الإسهال أثناء العلاج بالمضاد الحيوي لا بد من إبلاغ الطبيب قبل أخذ دواء مضاد للإسهال.