

Dompérone® 1 mg/ml

Dompéridone
Suspension buvable

COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Dompéridone1mg/ml.
Excipients : sorbitol 70%, saccharinate de sodium, cellulose microcristalline, polysorbate 20, propyl parabène sodium, méthyl parabène sodium, acide citrique anhydre.

Excipients à effet notoire : sorbitol, propyl parabène sodium, méthyl parabène sodium.

Flacon de 200 ml avec pipette graduée en Kg.

INDICATIONS :

Soulagement des nausées (envie de vomir) et des vomissements chez l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans et de 35 kg .

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION :

Posologie :

La posologie recommandée est de 10 ml de **Dompérone®** suspension buvable, soit 2 cuillères à café, 3 fois par jour.

La dose quotidienne maximale étant de 30 ml.

La durée du traitement ne doit pas dépasser 1 semaine sans avis médical.

Mode d'administration :

Voie orale. **Dompérone®** doit être pris avant les repas.

Bien agiter le flacon avant utilisation.

CONTRE- INDICATIONS :

- Allergie à la dompéridone ou à l'un des autres composants.
- Douleurs abdominales sévères ou des selles noires persistantes, hémorragie gastro-intestinale.
- Intestins obstrués ou perforés.
- Tumeur de la glande pituitaire (prolactinome).
- Maladie modérée ou sévère du foie.
- Allongement de l'intervalle QT à l'électrocardiogramme (ECG).
- Insuffisance cardiaque.
- Diminution ou augmentation du taux de potassium ou de magnésium dans le sang.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

• Prévenez votre médecin en cas de :

- Maladie des reins, du foie ou du cœur.
- Troubles du rythme cardiaque, difficultés à respirer, ou perte de conscience.
- Prise de médicaments antifongiques ou autres contre les infections.
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose (maladie héréditaire rare).
- Ce médicament contient du parahydroxybenzoate et peut provoquer des réactions allergiques.

INTERCATIONS MÉDICAMENTEUSES :

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, veuillez signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

Grossesse : il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse.

Allaitement : l'utilisation de ce médicament est déconseillée au cours de l'allaitement.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Une somnolence ou des sensations vertigineuses peuvent survenir au cours du traitement, en tenir compte lors de la conduite de véhicules et l'utilisation de machines.

EFFETS INDÉSIRABLES :

- **Fréquent** : bouche sèche.
- **Peu fréquents** : anxiété, disparition ou diminution de l'intérêt sexuel, maux de tête, somnolence, diarrhée, éruption cutanée, démangeaisons, seins douloureux ou sensibles, écoulement de lait des seins, fatigue, tremblements, rigidité musculaire, mouvements lents.

SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C, à l'abri de la lumière.

Ne pas mettre au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

Après première ouverture du flacon, le médicament doit être conservé au maximum 3 mois.

NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.

Liste II.

Date de révision de la notice : Mai 2022.

D.E. Algérie :

Dompérone® 1 mg/ml : 16/10 F 047/035.

Fabricant, détenteur de D.E. et conditionneur : Pharmalliance.

Domaine Kouchi Idir. Ouled Fayet, Alger - Algérie.

دومبرون® 1 مغ / مل

دومبريدون
معلق للشرب

التركيب و الشكل :

دومبريدون 1 مغ/مل.
السواغات : صوريبتول 70%، سكارينات الصوديوم، سيلولوز ميكروكريستالين، بوليسوربات 20، بروبيل بارابان الصوديوم، ميثيل بارابان الصوديوم، حمض السيتريك اللامائي.
سواغات ذات تأثير معلوم: صوريبتول، بروبيل بارابان الصوديوم، ميثيل بارابان الصوديوم.
زجاجة تحتوي على 200 مل مع ماصة مدرجة بالكغ.

دواعي الاستعمال :

تخفيف أعراض الغثيان والقيء عند البالغين والمراهقين الذين يتجاوز عمرهم 12 سنة و 35 كغ.

الجرعة و طريقة الإستعمال :

الجرعة :

الجرعة الموصى بها هي 10 مل من دومبرون® معلق للشرب، أي ملعقتين صغيرتين، 3 مرات في اليوم.
الجرعة اليومية القصوى هي 30 مل.
لا يجب أن تتجاوز مدة العلاج أسبوع واحد دون استشارة الطبيب.

طريقة الاستعمال :

عن طريق الفم. يجب أخذ دومبرون® قبل وجبات الطعام.
يجب رج الزجاجة جيدا قبل الاستخدام.

موانع الاستعمال :

- حساسية للدومبريدون أو لأحد المكونات الأخرى.
- آلام شديدة في البطن أو براز ذو لون أسود ونزيف معدي معوي.
- الأمعاء المسدودة أو المنتقبة.
- ورم في الغدة النخامية (برولاكتينوم).
- أمراض الكبد متوسطة أو شديدة.
- إطالة فترة QT على مخطط القلب الكهربائي.
- قصور القلب.
- انخفاض أو زيادة مستوى البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم.

تحذيرات خاصة و احتياطات الاستعمال :

• أخبر الطبيب في حالة :

- أمراض الكلى، الكبد أو القلب.
- اضطراب دقات القلب، صعوبة في التنفس، أو فقدان الوعي.
- أخذ الأدوية المضادة للفطريات أو الأدوية الأخرى ضد الالتهابات.
- لا ينصح باستخدام هذا الدواء عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل الفركتوز (مرض وراثي نادر).
- يحتوي هذا الدواء على باراهيدروكسي بنزوات وقد يسبب الحساسية.

التفاعلات الدوائية :

لتفادي التفاعلات الدوائية الممكنة ما بين عدة أدوية، يجب حتما إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

الحمل و الإرضاع :

الحمل : من المستحسن عدم استخدام هذا الدواء أثناء فترة الحمل.
الإرضاع : لا ينصح بأخذ هذا الدواء أثناء فترة الإرضاع.

الآثار على السيقانة و استخدام الآلات :

يمكن الإحساس بالنعاس أو الدوخة عند أخذ هذا الدواء، و بالتالي ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار عند القيادة واستخدام الآلات.

الآثار غير المرغوب فيها :

الشائعة : جفاف الفم.

الأقل شيوعا : قلق، زوال أو نقصان الاهتمام الجنسي، صداع، نعاس، إسهال، طفح جلدي، حكة، حساسية أو آلام في الثدي، إفراز حليب الثدي، تعب، ارتعاش، صلابة العضلات، بطء الحركة.
أخبر الطبيب أو الصيدلي عن أي آثار مزعجة لم تذكر في هذه النشرة.

فرط الجرعة :

في حالة فرط الجرعة، يجب استشارة الطبيب.

طريقة الحفظ :

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة لا تتجاوز 30 ° م ، بعيدا عن الضوء.
لا يوضع في الثلاجة.

لا يجمد.

بعد فتح القارورة لأول مرة، يجب الاحتفاظ بهذا الدواء لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

قائمة II

تاريخ مراجعة الوصفة : ماي 2022.

رقم مقرر التسجيل في الجزائر :

دومبرون® 1 مغ / مل : 16/ 10 F 047 /035

الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعين :

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر.