

# Imuzole® 500 mg

## Métronidazole

### Ovule

#### COMPOSITION ET PRÉSENTATION :

Métronidazole ..... 500 mg.

**Excipients:** glycérides hémi-synthétiques.

Boîte de 10 ovules.

#### INDICATIONS ET POSOLOGIE :

Traitement local des infections génitales chez la femme adulte, notamment les vaginites à trichomonas et vaginites non spécifiques.

**Vaginites à trichomonas :** 1 ovule d'**Imuzole® 500 mg** par jour par voie vaginale pendant 10 jours en association à un traitement par voie orale.

**Vaginites non spécifiques :** 1 ovule d'**Imuzole® 500 mg** par jour par voie vaginale pendant 7 jours en association à un traitement par voie orale si nécessaire.

Le traitement ne doit pas être pris plus de 10 jours (sauf avis médical) et ne doit pas être répété plus de 2 à 3 fois par an.

Il est impératif de traiter simultanément le partenaire, qu'il présente ou non des signes cliniques.

#### MODE D'ADMINISTRATION :

Voie vaginale. Introduisez l'ovule en position couchée, puis restez allongée pendant 5 à 10 minutes, de préférence le soir au coucher.

L'ovule peut être à l'origine d'un écoulement gênant, il est conseillé de mettre une protection.

#### CONTRE-INDICATIONS :

Allergie au métronidazole ou à la famille des imidazolés ou à l'un des excipients.

#### MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

• **Prévenez votre médecin en cas de :**

- réactions allergiques graves de la peau.
- troubles neurologiques.
- troubles psychiatriques.
- neuropathie périphérique.
- troubles sanguins.

• L'utilisation de cet ovule avec des préservatifs ou des diaphragmes peut augmenter le risque de rupture du latex.

• Pendant les règles, n'interrompez pas le traitement et évitez de porter des tampons.

• La coloration brun-rouge des urines est normale sous traitement.

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES :

• **Associations déconseillées :** alcool (boisson ou excipient), busulfan, disulfirame.

• **Associations nécessitant des précautions d'emploi:** carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne, rifampicine,

lithium.

• **Association à prendre en compte:** fluorouracile.  
**Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, veuillez signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.**

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

**Grossesse :** ce médicament peut être prescrit pendant la grossesse, si besoin.

**Allaitement :** l'utilisation de ce médicament pendant l'allaitement est déconseillée.

#### CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES :

Éviter la conduite de véhicules et l'utilisation de machines en cas de vertiges, de confusion, d'hallucinations, de convulsions ou de troubles visuels survenant au cours du traitement.

#### EFFETS INDÉSIRABLES :

• **Rares :** troubles digestifs (nausées, vomissements, maux d'estomac et diarrhée)

• **Exceptionnels :** urticaire, démangeaisons, sécheresse de la bouche, bouffées de chaleur, maux de tête, vertiges.

#### SURDOSAGE :

En cas de surdosage, consultez votre médecin.

#### CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité.

**NE JAMAIS LAISSER CE MÉDICAMENT À LA PORTÉE DES ENFANTS.**

#### Liste I.

**Date de révision de la notice :** Mai 2022.

**D.E Algérie :**

**Imuzole® 500 mg ovule :** 16/11 A 002/035.

**Fabricant, détenteur de la D.E et conditionneur :**  
**Pharmalliance.**

Domaine Kouchi Idir, Ouled Fayet-Alger, Algérie.

## إموزول® 500 مغ

ميترونيدازول

تحميله مهبلية

### التركيب و الشكل :

ميترونيدازول.....500 مغ.

السواغات : غليسريدات شبه إصطناعية

علبة تحتوي على 10 تحميلات مهبلية.

### دواعي الاستعمال و الجرعة :

علاج محلي للالتهابات التناسلية (داء المشعرات والتهاب المهبل غير محدد).

داء المشعرات المهبلية : تحميله مهبلية واحدة من إموزول®

500 مغ يوميًا عن طريق المهبل لمدة 10 أيام بالجمع مع علاج آخر عن طريق الفم.

التهاب المهبل غير المحدد : تحميله مهبلية واحدة من إموزول®

500 مغ عن طريق المهبل يوميًا لمدة 7 أيام بالجمع مع علاج آخر عن طريق الفم إذا لزم الأمر.

لا ينبغي أن يؤخذ العلاج لأكثر من 10 أيام (دون استشارة طبية). ولا يجب أن يتكرر أكثر من 2 إلى 3 مرات في السنة.

لا بد من علاج الشريك في نفس الوقت، سواء كانت لديه أعراض أم لا.

### طريقة الاستعمال :

عن طريق المهبل. يتم إدخال التحميلة المهبلية في وضعية التمديد، ثم الاستلقاء لمدة 5 إلى 10 دقائق. يمكن أن تكون التحميلة سبب في حدوث سيلان مزعج، من الأفضل وضع حماية.

### موانع الاستعمال :

حساسية للميترونيدازول أو عائلة إيميدازول أو لأي من السواغات.

### تحذيرات و احتياطات الاستعمال :

أخبر طبيبك في حالة :

- حساسية شديدة للجلد.

- اضطرابات عصبية.

- اضطرابات نفسية.

- أمراض عصبية محيطية.

- اضطرابات في الدم.

• استخدام هذه التحميلة المهبلية مع الواقي الذكري أو الحجاب الحاجز قد يزيد من خطر كسر اللاتكس.

• أثناء الحيض، لا توقف العلاج وتجنب ارتداء سدادات قطنية.

• لون البول الأحمر والبنّي طبيعي تحت العلاج.

### التفاعلات الدوائية :

الجمع غير المنصوح به : كحول (مشروب أو سواغ)، بوسلفان، ديسلفرام.

الجمع الذي يتطلب احتياطات الإستعمال : كاربامازيبين، فينوباربيتال، فينيتوين، ريفامبيسين، ليشيوم.

الجمع الذي يؤخذ في الاعتبار : فلورويوراسيل.

لتفادي التفاعلات الدوائية الممكنة ما بين عدة أدوية، يجب حتما إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر يؤخذ في نفس الوقت.

### الحمل و الإرضاع :

الحمل : يمكن وصف هذا الدواء أثناء الحمل، إذا لزم الأمر.

الإرضاع : لا ينصح بأخذ هذا الدواء أثناء الإرضاع.

### الآثار على السياقة و استخدام الآلات :

تجنب القيادة واستخدام الآلات في حالة دوار، ارتباك، هلوسة، تشنجات أو اضطرابات بصرية متعلقة باستخدام هذا الدواء.

### الآثار غير المرغوب فيها :

• النادرة : اضطرابات الجهاز الهضمي (غثيان، قيء، ألم في المعدة أو إسهال).

• الاستثنائية : طفح جلدي، حكة، جفاف الفم، هبات ساخنة، صداع، دوار.

### فرط الجرعة :

في حالة فرط الجرعة، استشر طبيبك.

### طريقة الحفظ :

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 25 °م، بعيدا عن الرطوبة. لا يترك هذا الدواء في متناول الأطفال.

### قائمة I.

### تاريخ مراجعة الوصفة :

ماي 2022.

### رقم مقرر التسجيل في الجزائر :

إموزول® 500 مغ : 16/11 A 002/035.

### الصانع، صاحب مقرر التسجيل و المعبي :

فارماليانس.

حوش كوشي إدير، أولاد فايت – الجزائر